

beaucoup plus volumineuse marque l'origine de la caudale. Les nageoires sont grisâtres; on voit quelques petites taches sur la dorsale.

L'espèce est vivipare, comme le prouve l'un des individus types qui contient une dizaine de petits complètement développés, dont l'un même, prêt à s'échapper, a déjà la tête engagée en dehors de l'orifice génital.

D. 16 à 17; A. 14 à 16; P. 12; V. 5; L. lat. 32.

N° 97 — 371-373 Coll. Mus. — Sources, mares et fossés de l'Agua Azul. Environs de Guadalajara (Jalisco).

Longueur totale : 62, 53 et 29 millimètres.

Cette espèce se rapproche, surtout par sa dentition, du *Xenendum xaliscone* Jordan et Snyder du lac de Chapala, dont elle se distingue par sa dorsale plus longue, ses écailles plus grandes, et de *Xenendum caliente* J. et S. du Rio Verde, dont nous avons pu examiner des échantillons types, que le Muséum vient de recevoir de l'Université «Leland Stanford Junior», et dont elle se sépare aussi par sa dorsale plus allongée, insérée plus en arrière, son pédicule caudal plus grêle, ses yeux plus grands et sa coloration.

CATALOGUE DES HYMÉNOPTÈRES MELLIFÉRIDES DES COLLECTIONS
DU MUSÉUM,

PAR M. R. DU BUYSSON.

PREMIÈRE LISTE.

M. le D^r H. Friese, d'Iéna, a bien voulu déterminer nos Hyménoptères appartenant à plusieurs genres du groupe des *Anthophorinae*, de la famille des *Melliferidae*. En voici la liste :

Diphaglossa.

SPINOLA, Gay, *Hist. fis. Chile. Zool.* VI, 1851, p. 168, n° 4.

GAYI Spinola ♂. — Chili (Gay 1843) type! Patagonie (d'Orbigny, 1834).

Oxaca.

KLUG, *Magaz. Ges. naturf. Fr.* Berlin I, 1807, p. 261.

FLAVESCENS Klug ♀. — Vénézuéla; Brésil : Bahia (Coll. Sichel, 1867).

FUSCESCENS Sichel ♂♀. — Vénézuéla : Caracas (Coll. Sichel, 1867) types!

AUSTERA Gerstaecker ♂. — Pérou : Pampas del Sacramento (de Castelnau, 1847); Mexique (Sallé, 1859); Vénézuéla : Caracas (Coll. Sichel, 1867).

Exomalopsis.

SPINOLA, *Mem. accad. sc. Torino*, XIII, 1851, p. 89.

- CHALYBEA Friese ♀. — Brésil : Ouest de la capitainerie des Mines (A. Saint-Hilaire, 1820).
GLOBOSA Friese ♂♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).
LIMATA Cresson ♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).
OTOMITA Cresson ♀. — Mexique; Brésil : Rio-Janeiro (Coll. Sichel, 1867).
PENELOPE Friese ♂♀. — Mexique; La Havane (Coll. Sichel, 1867).
PLANICEPS Smith ♂♀. — Brésil (Coll. Sichel, 1867).
PULCHELLA Cresson ♀. — La Havane (Coll. Sichel, 1867).

Tetrapaedia.

KLUG, *Magaz. Ges. naturf. Fr.* Berlin, IV, 1810, p. 33.

- ALBITARSIS Friese ♀. — Brésil (Gaudichaud, 1833) type!
AMPLITARSIS Friese ♀. — Brésil : Ouest de la capitainerie des Mines, Nord de la capitainerie de Saint-Paul (A. Saint-Hilaire, 1820); Itu (J. de Joannis, 1898) types!
ANTENNATA Friese ♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).
BUNCHOSIA Friese ♀. — Guatémala (Angrand 1855); Brésil : Rio-Janeiro (Coll. Sichel, 1867).
CALCARATA Cresson ♂♀. — Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862).
CLYPEATA Friese ♀. — Brésil : Saint-Paul (Coll. Sichel, 1867).
DIVERSIPES Klug ♂♀. — Cayenne (Coll. Bosc, 1828); Brésil (A. Saint-Hilaire, 1820; Coll. Sichel, 1867).
FLAVIVENTRIS Friese ♂. — Brésil : Rio-Janeiro (Coll. Sichel, 1867).
MACULATA Friese ♂. — Brésil (Coll. Sichel, 1867).
MAESTA Cresson ♂. — Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862; Coll. Sichel, 1867).
MANDIBULARIS Friese ♀. — Brésil (Coll. Sichel, 1867) type!
MAURA Cresson ♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).
PILIVENTRIS Friese ♀. — Amérique (Coll. Sichel, 1867).
PYRAMIDALIS Friese ♂. — Brésil (Coll. Sichel, 1867).
RUGULOSA Friese ♀. — Brésil (Coll. Sichel, 1867).
SERRATICORNIS Friese. Var. *rufescens* Friese ♂. — Amérique (Coll. Sichel, 1867).

Epicharis.

KLUG, *Magaz. f. Insectenk.* VI, 1807, p. 226.

- ANALIS Lepeletier ♂♀. — Rio-Janeiro, types! Brésil (Ménétrières); Bahia (Coll. Sichel, 1867).

BICOLOR Smith ♂♀. — Mexique : Oaxaca (Coll. Sichel, 1867).

DEJEANI Lepeletier ♂♀. — Brésil (A. Saint-Hilaire, 1815, types! et *E. analis* Lepeletier, types! *ex parte*; Coll. Bosc, 1828, sous le nom de *Bombus furcatus* Fabricius; Goudot, 1834; Petitbeau, 1837; Audouin; Ménériès; Sylveira, 1833); Rio-Janeiro; Bahia (Coll. Sichel, 1867).

ELEGANS Smith ♂♀. — Mexique (Sallé, 1859); Orizaba (L. Biart, 1862); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867).

EXCISA Mocsary ♂♀. — Amérique (Coll. Sichel, 1867).

FASCIATA Lepeletier ♂♀. — Brésil (A. Saint-Hilaire, 1815) type! Bahia (Coll. Sichel, 1867).

LUNULATA Mocsary ♂♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867); Cayenne (Coll. Sichel, 1867); Guatémala : Haute-Vera Paz (Bocourt, 1866).

MACULATA Smith ♂♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).

METATARSALIS Friese ♂. — Darien (F. Geay, 1896) type!

RUSTICA Olivier ♂♀. — Cayenne (Coll. Bosc, 1828, sous le nom de *C. hirtipes* Fabricius; Coll. Sichel, 1867); Brésil (Coll. Sichel, 1867; Sylveira, 1832); Colombie; Java (Coll. Sichel, 1867).

— Var. *flava* Friese ♂♀. — Brésil: Bahia, Saint-Thomas, Saint-Paul (Coll. Sichel, 1867); Brésil (A. Saint-Hilaire, 1820; Goudot, 1834; Sylveira, 1833; Mauger, 1853); Para (Gilhiani, 1845); Rio-Janeiro (Coll. Sichel, 1867); Itu (J. de Joannis, 1898); Cayenne (Coll. Sichel, 1867; Banon, 1834); Mexique (Sallé, 1869); Pérou (Coll. Sichel, 1867).

UMBRACULATA Fabricius ♂♀. — Amérique (Leprieur, 1834); Brésil: Para (Reich, 1838); Brésil (Coll. Bosc, 1828); Cayenne (Leprieur, 1839; coll. Sichel, 1867; Banon, 1834. *E. cajennæ* Lepeletier, type!).

Centris.

FABRICIUS, *Syst. Piez*, 1804, p. 354, n° 68.

ÆNEA Lepeletier ♀. — Brésil: Nord de la capitainerie de Saint-Paul: capitainerie des Mines (A. Saint-Hilaire, 1820) types! Mariquita (Bolívar, 1886); Mexique (Giesbrecht, 1845).

AGILIS Smith ♂♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867); côte occidentale (L. Biart, 1862), Orizaba, Cordova (Coll. Sichel, 1867).

— Var. *abdominalis* Friese ♀. — Guatémala : Haute-Vera Paz (Bocourt, 1866) types! C'est par erreur que M. le docteur Friese indique ces deux insectes comme provenant de Vera-Cruz du Mexique.

AMERICANA Klug ♀. — Brésil : Para? (Reich, 1838).

APICALIS Smith ♀. — Saint-Thomas (Coll. Sichel, 1867).

— Var. *rufescens* Friese ♀. — Pérou : Pampas del Sacramento (de Castelnau, 1847).

- ATERRIMA Smith ♂♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).
- ATRIVENTRIS Mocsary ♂♀. — Guyane (Leprieur, 1839); Brésil : Para (Gilhiani, 1846); Mexique (Roger, 1834 et Coll. Sichel, 1867); Cayenne; Amazones (Coll. Sichel, 1867).
- BICOLOR Lepeletier ♀. — Brésil (Coll. Sichel, 1867).
- BIMACULATA Lepeletier ♂♀. *C. fuscata* Lepeletier. — Brésil : Nord de la capitainerie de Saint-Paul (A. Saint-Hilaire, 1820) types! Caracas (Coll. Sichel, 1867); Vénézuéla septentrional : Bas-Sarare (F. Geay, 1896).
- BIRKMANNI Friese ♂. — Mexique (Coll. Sichel, 1867).
- CHILENSIS Spinola ♂♀. — Chili (Coll. Sichel, 1867).
- CLYPEATA Friese ♂♀. — Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862; Coll. Sichel, 1867) types!
- COLLARIS Lepeletier ♀. — Brésil : Nord de la capitainerie de Saint-Paul (A. Saint-Hilaire, 1820) type! Brésil : Itu (J. de Joannis, 1898).
- CONSPERSA Mocsary ♂♀. — Brésil : Minas Geraes (Claussen, 1843); Brésil (Sylveira, 1833); Para (Reiche, 1836); Matto grosso (de Castelnau, 1847).
- DECOLORATA Lepeletier ♂♀. — Brésil : Bahia; Mexique : Vera-Cruz (Coll. Sichel, 1867; Sallé, 1856); Bogota (1862); Cayenne (Feisthamel, 1838); Guadeloupe (Coll. Sichel, 1867).
- DECORATA Smith. — Cayenne ou Vénézuéla; Brésil ; Bahia (Coll. Sichel, 1867).
- DERASA Lepeletier ♂♀. — Cayenne (Banon, 1834, *C. emarginata* Lepeletier, type!); Cayenne (1838; Coll. Sichel, 1867); La Plata (Coll. Sichel, 1867).
- DIFFORMIS Smith ♀. — Cayenne (Coll. Sichel, 1867).
- DISCOLOR Smith ♀. — Amérique (Expédition Freycinet; Coll. Sichel, 1867).
- DORSATA Lepeletier ♀. — Brésil (type!); Amérique septentrionale (de Castelnau, 1843).
- FACIALIS Mocsary ♀. — Mexique : Oaxaca (Coll. Sichel, 1867); côte occidentale (L. Biart, 1862).
- FASCIATELLA Friese ♂. — Amérique (Coll. Sichel, 1867) type!
- FESTIVA Smith ♂♀. — Colombie; Vénézuéla (Coll. Sichel, 1867; F. Geay, 1896).
- FLAVIFRONS Fabricius. *C. scapulata* Lepeletier ♂♀. — Amérique (Leprieur, 1834); Brésil (A. Saint-Hilaire, 1815; Freycinet; Coll. Sichel, 1867); Cayenne (Coll. Sichel, 1867).
- FLAVILABRIS Mocsary ♀. — Pérou ; Pampas del Sacramento (de Castelnau, 1847).
- FLAVOPICTA Smith ♂. — Brésil (Coll. Sichel, 1867).
- FULVIVENTRIS Cresson ♀. — Pérou (Coll. Sichel, 1867).
- FURCATA Fabricius ♂♀. — Brésil; Chili (Audouin, 1834; Coll. Sichel, 1867); Chili : Anca (Dubois, 1843).

- FUSCIVENTRIS** Mocsary ♂♀. — Bolivie : Chiquitos (d'Orbigny, 1834); Bogota (1862); Brésil (Solier, 1834).
- HÆMORRHOIDALIS** Fabricius ♂♀. — Saint-Domingue; Brésil; Saint-Thomas (Coll. Sichel, 1867).
- INERMIS** Friese ♂♀. — Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862; Coll. Sichel, 1867); Brésil (Ménétries); Amazones (Coll. Sichel, 1867).
- INSIGNIS** Smith ♂♀. — Bogota (1862; Coll. Sichel, 1867); Colombie (Parzudacki, 1842); Colombie : Sainte-Marthe (Vauvert, 1853).
- LANIPES** Fabricius ♂♀. — Brésil : Ouest de la capitainerie des Mines, Nord de la capitainerie de Saint-Paul, Sud de la capitainerie de Goyaz (A. Saint-Hilaire, 1820), province de Corrientes (d'Orbigny, 1834); Montevideo; Para; Saint-Jean (Coll. Sichel, 1867); Uruguay; Cayenne; Vénézuëla (Coll. Sichel, 1867); Bas-Sarare (F. Geay, 1896); Pérou : Pampas del Sacramento (de Castelnau, 1847); rives de l'Amazone (1855); Nicaragua (Mniszech, 1871); Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867); Antilles (Plée, 1826); Costa-Rica (de Lafon, 1884).
- Var. *tarsata* Smith. *C. tarsata* Smith. ♀. — Guadeloupe (Gardemal, 1889); Guyane française (Mélinon, 1863).
- LABROSA** Friese ♂♀. — Bogota (1862), Cayenne (Leprieur, 1839), Surinam (Leschnault); Brésil : Nord de la capitainerie de Saint-Paul, Sud de la capitainerie de Goyaz (A. Saint-Hilaire, 1820); Bahia (Coll. Sichel, 1867); Brésil (Gaudichaud, 1833, Sylveira, 1833) types!
- LANGSDORFFI** Blanchard ♀. — Brésil : Para (Reiche, 1836) type!
- LATICINCTA** Spinola ♀. — Guyane française : Saint-Laurent (Audouit, 1862); Maroni (Coll. Sichel, 1867); Brésil : Para (Coll. Sichel, 1867).
- LINEOLATA** Lepeletier ♀. — Amazones; Cayenne (Coll. Sichel, 1867); Brésil : Minas Geraes (Claussen, 1843).
- MACULATA** Lepeletier ♂. — Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862).
- MEXICANA** Smith ♂♀. — Mexique (Sallé, 1859; Coll. Sichel, 1867; Laporte, 1834; Dugès, 1864; Génin, 1897); côte occidentale (L. Biart, 1864); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867).
- MOERENS** Perty ♀. — Brésil : Nord de la capitainerie de Saint-Paul (A. Saint-Hilaire, 1820; *C. chrysitis* Lepeletier, type!).
- MOCSARYI** Friese ♀. — Brésil : Minas Geraes (de Castelnau, 1847) type!
- MORSEI** Cockerell ♂. — Texas (Coll. Sichel, 1867).
- NIGERRIMA** Spinola ♂♀. — Chili (Gay, 1843, type! Coll. Sichel, 1867).
- NIGRIPES** Friese. — Bogota (1839) co-type!
- NITENS** Lepeletier ♂♀. — Mexique : côte occidentale (L. Biart, 1864); Brésil : Para (Coll. Sichel, 1867).
- NITIDA** Smith ♂♀. — Mexique (Sallé, 1859; Coll. Sichel, 1867); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867); côte occidentale (L. Biart, 1864); Amazones (Coll. Sichel, 1867).

NOBILIS Westwood ♂. — Mexique (Sallé, 1856; Coll. Sichel, 1867); Vera-Cruz (Coll. Sichel, 1867).

OBSOLETA Lepeletier ♂♀. — Brésil (A. Saint-Hilaire, 1815); Cayenne; Caracas (Coll. Sichel, 1867).

PERSONATA Smith ♂♀. — Cayenne (Leprieur, 1839); Surinam; Cordova (Coll. Sichel, 1867); Mexique (Sallé, 1869).

PLUMIPES Smith ♀. — Mexique; Amazonas (Coll. Sichel, 1867).

POECILA Lepeletier ♂♀. — Mexique (Sallé, 1859; Coll. Sichel, 1867); Orizaba (L. Biart, 1862); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867); La Havane (Coll. Sichel, 1867); Cuba (Guérin-Ménéville, *Id. du R. an.*, p. 455. *Anthophora versicolor* Fabr. var. *apicalis* Guérin type!).

PYROPYGA Spinola, var. *analis* Lepeletier; *C. analis* Lepeletier ♀. — Brésil ou Cayenne, types!

PROXIMA Friese ♀. — Amazonas (Coll. Sichel, 1867).

SCOPIPES Friese *nec Illiger* ♂♀. — Mexique; Brésil (Coll. Sichel, 1867).

TESTACEA Lepeletier ♀. — Saint-Domingue (Coll. Bosc, 1828).

VARIA Erichson ♀. — Brésil; Pérou : Pampas del Sacramento (de Castelnau, 1847).

VERSCOLOR Fabricius ♂♀. — Guadeloupe (Coll. Bosc, 1828; Gardemal, 1889); rives de l'Amazone (1855); Brésil (Ménétrières); Bogota (1862); Caracas; Mexique; Saint-Thomas (Coll. Sichel, 1867); Mexique : côte occidentale (L. Biart, 1864), Orizaba (L. Biart, 1862).

VIOLACEA Lepeletier ♀. — Brésil : nord de la Capitainerie de Saint-Paul (A. Saint-Hilaire, 1820) types!

VITTATA Lepeletier ♂♀. — Brésil : nord de la Capitainerie de Saint-Paul, Capitainerie de Rio-Grande (A. Saint-Hilaire, 1820) types! Mexique (Coll. Sichel, 1867).

XANTHOCNEMIS Perty ♂♀. — Brésil : nord de la Capitainerie de Saint-Paul (A. Saint-Hilaire, 1820; *C. pulverata* Lepeletier, type!); Brésil (A. Saint-Hilaire, 1815); Capitainerie de Rio-Grande (A. Saint-Hilaire, 1820); Saint-Paul (Coll. Sichel, 1867).

Euglossa.

LATREILLE, *Hist. nat. Crust. et Insectes*, III, 1802, p. 385.

BRULLEI Lepeletier ♂♀. — *Patria ignota*, type! Cayenne (de Bar, 1852; Coll. Sichel, 1867; Banon, 1834); Saint-Laurent (Mélinon, 1862); Brésil : Para (Reiche, 1836); Mexique (1840).

CORDATA Linné ♂♀. — Mexique (Sallé, 1858; Coll. Sichel, 1867); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867); Orizaba (L. Biart, 1862); Tampic (Coll. Sichel, 1867); Darien (F. Geay, 1896); Bogota (1862); Panama (Criado, 1889); Guyane française : Cayenne (Leschnault; Coll. Sichel, 1867); Saint-Laurent (Mélinon, 1852); Brésil (Coll. Sichel, 1867); Para, Bahia (Coll. Sichel, 1867; Petitbeau, 1837; Sylveira, 1833).

PILIVENTRIS Guérin-Meneville ♂♀. — Brésil : Para (Leprieur, 1834; Reiche, 1836) types! Mexique (L. Biart, 1862; Coll. Sichel, 1867); Cordova, Bogota (Coll. Sichel, 1867); Cayenne (Banon, 1834; Mélinon, 1863); Brésil (Coll. Sichel, 1867); Manaos (d'Anthonay, 1892); Mexique, Cuba (de Brémond, 1839).

VARIABILIS Frise ♂♀. — Guatémala (R. Oberthur, 1897); Panama (Criado, 1889); Bogota, Mexique (A. Sallé, 1859; Coll. Sichel); Orizaba (L. Biart, 1862); Oaxaca (Coll. Sichel, 1867); Para (Gilhiani, 1846; Coll. Sichel, 1867); Rio-Janeiro; Cayenne (Coll. Sichel, 1867; Mélinon, 1863).

Eumorpha.

H. FRIESE, *Termez. füzeteck*, XXII, 1899, p. 126.

ENEIVENTRIS Mocsary ♀. — Brésil : Rio-Janeiro (A. Saint-Hilaire, 1815).

COERULESCENS Lepeletier ♀. — Mexique (de Castelneau, 1834) type! Brésil (Coll. Sichel, 1867); Itu (J. de Joannis, 1898); Rio-Janeiro; Amérique du Sud (Parzudacki, 1842).

MARIANA Mocsary ♀. — Pérou : Cusco (Pentland, 1839); Cusco (Gay, 1849).

PULCHRA Smith ♂. — Bogota (Coll. Sichel, 1867).

PURPURATA Mocsary ♀. — Pérou : Pampas del Sacramento (de Castelneau, 1847); Bogota (Coll. Sichel, 1867).

SUPERBA Mocsary ♂. — Pérou : Cusco (Pentland, 1839).

VIOLACEA Blanchard ♀. — Brésil (Coll. Sichel, 1867; Fontaine, 1834; A. Saint-Hilaire, 1815; Goudot, 1834; Sylveira, 1833); Itu (J. de Joannis, 1898).

Eulema.

LEPELETIER, *Hist. nat. Insectes Hymen*, II, 1841, p. 148.

DIMIDIATA Fabricius ♂♀. — Amérique (Leprieur, 1834); Mexique; Darien (F. Geay, 1896); Colombie : Santa Marta (Fontanier, 1852); Cayenne (1838); la Mana (Mélinon, 1864); Pérou : Yarimagua (Sallé, 1886); Brésil : Para (Gilhiani, 1846); Bahia (Coll. Sichel, 1867); Vénézuéla septentrional (F. Geay, 1896; Chaper, 1885).

— Var. *flavescens* Friese ♂♀. — Brésil : Bahia (Coll. Sichel, 1867); Vénézuéla : bas Sarare (F. Geay, 1896); Bogota (1862); Mexique (Coll. Sichel, 1867).

— Var. *niveofasciata* Friese ♀. — Cayenne; Brésil : Bahia (Coll. Sichel, 1867).

FASCIATA Lepeletier ♂♀. — Amérique (Leprieur, 1834); Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862); Colombie : Santa Marta (Fontanier, 1852); Bogota (1862); Brésil : Para (Gilhiani, 1845), Bahia (Coll. Sichel, 1867); Nicaragua (de Mnischech, 1871); Guyane (Leprieur, 1839); Cayenne (1838; de Bar, 1852; Milius, 1820); Guatémala : Haute-Vera Paz (Bocourt, 1866); Pérou (Coll. Sichel, 1867).

NIGRITA Lepeletier ♂♀. — Amérique (Leprieur, 1834); Amérique du Sud (1851); Cayenne (Coll. Sichel, 1867; Banon, 1834); Surinam (Leschnault); La Mana (Mélinon); Vénézuéla : Caracas; Puerto Cabello (Coll. Sichel, 1867); Panama (Criado, 1889); Brésil : Bahia (Coll. Sichel, 1867); Mexique (Sallé, 1869; L. Biart, 1864; Roger, 1834).

MEXICANA Mocsary, Var. *inermis* Friese ♂. — Cayenne, Mexique (Coll. Sichel, 1867).

RUGOSA Friese ♀. — Mexique (Coll. Sichel, 1867); Orizaba (L. Biart, 1862).

LIMBATA Mocsary ♀. — Cayenne (Coll. Sichel, 1867).

MOCSARYI Friese ♀. — Brésil : Para (Gilhiani, 1846); Cayenne (Banon, 1834).

SURINAMENSIS Linné ♂♀. — Cayenne (Coll. Bosc, 1828); Mexique : Orizaba (L. Biart, 1862; Coll. Sichel, 1867; Sallé, 1856; Giesbreght, 1842, 1844); Guatémala (Angrand, 1855); Vénézuéla : Caracas (Coll. Sichel, 1867; F. Geay, 1896); Colombie : Santa Marta (Fontanier, 1852); Nicaragua (de Mnischech, 1871).

VIOLASCENS Mocsary ♀. — Panama (Criado, 1889).

SUR UN NOUVEL HÉMIPTÈRE HALOPHILE,
HERMATOBATODES MARCHEI, N. GEN., N. SP.,

PAR H. COUTIÈRE ET J. MARTIN.

La brève description que nous avons donnée de ce genre, dans une note antérieure ⁽¹⁾, porte uniquement sur deux sp. ♀, rapportés des Philippines par M. Marche. Depuis, nous avons retrouvé dans les collections du Muséum, en même temps qu'une troisième ♀, le ♂ de cette espèce, jusqu'alors inconnu. Alors que la ♀ diffère très profondément des *Hermatobates*, il se trouve que le ♂ s'en rapproche au contraire au plus haut point, de sorte qu'à l'intérêt qu'ils présentaient déjà, les *Hermatobatodes* joignent celui d'une différence sexuelle qu'on rencontre rarement aussi marquée.

Les deux ♀ étudiées en premier lieu étaient accompagnées de deux

(1) C. R., Acad. Sc., mai 1901.



Du Buysson, Robert. 1901. "Catalogue des Hyménoptères Melliférides des collections du Muséum." *Bulletin du Muse*
um d'histoire naturelle 7(5), 207–214.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/137054>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/328105>

Holding Institution

University Library, University of Illinois Urbana Champaign

Sponsored by

University of Illinois Urbana-Champaign

Copyright & Reuse

Copyright Status: Not provided. Contact Holding Institution to verify copyright status.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.