

atteint 93.1. Le nez, un peu moins large, est beaucoup plus haut (larg., 25 millimètres; haut., 53 millimètres) et l'indice nasal, 47.1, est à la limite supérieure de la leptorhinie.

Si courte qu'elle soit, la petite série des crânes Tchouang recueillie, non sans quelque péril, par M. le consul François, confirme donc les témoignages des voyageurs sur l'état mixte de cette population montagnarde, et quelques-uns des traits morphologiques qu'on y relève viennent à l'appui des données recueillies dans son précieux ouvrage sur la frontière sinoannamite par le regretté Devéria⁽¹⁾.

CATALOGUE DES OISEAUX RAPPORTÉS PAR LA MISSION CHARI-LAC TCHAD,
PAR M. OUSTALET.
(TROISIÈME PARTIE.)

69. PRIONOPS POLIOCEPHALUS Stanl.

Reichenow, *Die Vögel Afrikas*, t. II, part. 2, p. 531, n° 1110.

Deux individus dont une femelle tuée à Beso, en septembre 1902. Cet Oiseau avait les pattes d'un jaune orangé, les yeux gris cerclés de jaune d'or. Il ne diffère pas d'un spécimen de la collection du Muséum provenant de la région du Nil Blanc et envoyé, il y a une cinquantaine d'années, par M. d'Arnaud.

Le *Prionops* à tête grise, que l'on croyait cantonné dans l'Afrique orientale, s'étend donc jusque dans le centre et même un peu dans l'Ouest du continent.

70. NICATOR CHLORIS Less.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 554, n° 1134.

Une femelle tuée à Impfondo en août 1902. Yeux et pattes noirs.

71. LANIARIUS ERYTHROGASTRI Kretzschm.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 586, n° 1172.

Deux mâles tués à Fort-Archambault en janvier et février 1903. Le premier avait les yeux jaunes, le second les yeux gris, les pattes étaient noires chez tous deux.

72. DRYOSCOPIUS GAMBENSIS Licht.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 595, n° 1179.

Un spécimen de Fort-Archambault, janvier 1903.

(1) G. DEVÉRIA, *La frontière sino-annamite*, Paris, 1880, in-8°, p. 92, 94, etc., avec 2 portraits chinois.

73. *LANIUS HUMERALIS* Smith.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2; p. 610, n° 1192 b.

Une femelle de Krébedjé, décembre 1902. Yeux d'un gris bleu, pattes noires.

Chez cet individu, la queue est moins fortement marquée de blanc à l'extrémité que chez un *Lanius humeralis* mâle pris à Porto-Nuovo (Dahomey) par M. Miegemarque et envoyé au Muséum en 1895.

74. *LANIUS EXCUBITORIUS* Prév. et Des Murs.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 615, n° 1200.

Un spécimen pris à Djimtilo, le 18 août 1903.

Le *Lanius excubitorius* n'est signalé par M. Reichenow que dans l'Afrique orientale.

75. *DICRURUS AFER* A. Licht.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 646, n° 1232.

Quatre spécimens, savoir : un mâle et une femelle tués à Beso (ou Bessou), en septembre 1902; une femelle tuée à Fort-Archambault, en février 1903, et un mâle tué à Krébedjé. Les pattes étaient noires chez tous ces individus, mais la coloration de l'iris variait d'un sujet à l'autre : les yeux, en effet, étaient noirs chez la femelle de Beso, roses chez le mâle de la même localité, rouge-orange chez la femelle de Fort-Archambault et chez le mâle de Krébedjé. M. Reichenow indique, de son côté, l'iris comme étant rouge chez le *Dicrurus afer*.

Un individu de cette espèce avait été obtenu, en 1891, à Bangui (Congo), par M. J. Dybowski.

76. *ORIOLOUS AURATUS* V.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 655, n° 1239.

Deux femelles de Krébedjé, décembre 1902. Yeux roses, pattes noires.

77. *SPREO PULCHER* P. L. S. Müll.

R. B. Sharpe, *Cat. Birds Brit. Museum*, t. XIII, p. 191; Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 675, n° 1213.

Un spécimen de Djimtilo, 18 septembre 1903.

78. *LAMPROCOLIUS SPLENDIDUS* Bon. et V.

R. B. Sharpe, *Cat. Birds Brit. Museum*, t. XIII, p. 172, et pl. VII, fig. 4; Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 793, n° 1269.

Trois individus dont deux portent, comme indications : Kouka, 16 septembre 1903, et le troisième Sao, 13 septembre 1903.

79. LAMPROTORNIS CAUDATUS St. Müll.

Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 708, n° 1291.
Trois spécimens de Kousri.

80. PLOCEPASSER SUPERCILIOSUS Gretzschm.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 14, n° 1308.
Un spécimen de Finda, décembre 1903.

81. SPOROPIPES FRONTALIS Daud.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 17, n° 1311.
Deux exemplaires, sans indication précise de localité, sont semblables au type du *Sénégal* à *front pointillé* de Vieillot, type qui, après avoir fait partie de la collection du comte de Riocour, se trouve actuellement dans la collection donnée par M. Boucard au Muséum d'histoire naturelle.

84. PLOCEUS (HYPHANTURGUS) OCULARIUS var. BRACHYPTERUS Sw.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 47, n° 1347 b.
Un spécimen.

82. PLOCEUS (HYPHANTORNIS) COLLARIS V.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 61, n° 1360.
Un exemplaire (mâle adulte), tué par M. le Dr Decorse à Brazzaville, au mois d'août de l'année 1902, est semblable à un autre Oiseau du même sexe, obtenu précisément dans la même localité, en 1891, par M. J. Dybowski. Le Tisserin tué par M. Decorse avait les yeux rouges et les pattes couleur de chair. Ce sont aussi les couleurs indiquées par M. Reichenow.

83. PLOCEUS (SITAGRA) MONACHUS Sharpe.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 75, n° 1377.
Un mâle et deux femelles de Kousri, 6 août 1903.

84. PLOCEUS (SITAGRA) HEUGLINI Rehw.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 84, n° 1386.
Un mâle de Kousri, 6 août 1903.
Cette espèce, découverte dans l'Afrique orientale, avait déjà été signalée dans la Haute-Guinée.

85. PLOCEUS (PLOCEUS) SUPERCILIOSUS Shell.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 96, n° 1398.
Cinq femelles de Fort-Archambault, février 1903.

86. *PLOCEUS (XANTHOPHILUS) AUREOFLAVUS* A. Sm.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 91, n° 1391.

Un spécimen tué par M. Decorse à Bangui, en août 1902, ne diffère pas d'un exemplaire tué par M. J. Dybowski, dans la même localité, en 1891.

87. *QUELEA SANGUINIROSTRIS* L.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 108, n° 409.

Trois individus, dont deux sont évidemment des mâles et le troisième une femelle, ont été tués par M. Decorse, à Djimtilo, en septembre 1903.

88. *PYROMELANA FLAMMICEPS* Sw.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 118, n° 1421.

Un mâle, de Fort-Possel, 3 septembre 1902, avait les yeux noirs à reflets rouges et les pattes d'un rouge brunâtre clair, tirant au rouge chair. Il ressemble absolument à un spécimen pris à Conakry, par M. le Dr Maclaud. Les indications fournies par M. le Dr Decorse, relativement à la coloration de l'iris et des pattes, concordent parfaitement avec celle que nous donne M. Reichenow.

89. *PYROMELANA FRANCISCANA* Isert.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 122, n° 1425.

Trois spécimens de Kousri, août 1903, sont, les uns en plumage de noces complet, le troisième en plumage de transition.

90. *COLIUSPASSER MACRURUS* Gm.

Coliuspasser macrura Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 138, n° 1437.

Un spécimen de Krébedjé, novembre 1902, ne diffère pas d'un spécimen obtenu antérieurement à Conakry par M. le Dr Maclaud. Il avait l'iris et les pattes noirs.

91. *AMADINA FASCIATA* Gm.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 146, n° 1445.

Un exemplaire semblable à un spécimen faisant partie de la collection Boucard et provenant du pays des Bogos.

92. *AIDEMOSYNE CANTANS* Gm.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 156, n° 1454.

Un spécimen.

93. *HYPARGOS MONTEIRI* Harth.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 158, n° 1457.

Un spécimen semblable à un exemplaire venant du Congo.

94. *ESTRILDA CINEREA* V.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 182, n° 1490.

Deux individus tués à Kousri, le 6 août 1903.

95. *LAGONOSTICTA NIGRICOLLIS* Heugl.

Lagonosticta nigricollis R. B. Sharpe, *Cat. Birds Brit. Museum*, t. XIII, p. 286; *Estrilda nigricollis* Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 191, n° 1506.

Un mâle adulte et un jeune mâle (?) sans indication précise de localité et une femelle (?) tuée sur les bords de la rivière Gribingui, en décembre 1903. Le mâle adulte répond bien à une description donnée par Heuglin et par Reichenow; l'individu, que je considère comme un jeune mâle ou comme un mâle au plumage d'hiver, n'a point de rabat noir, mais seulement une tache noirâtre sous le menton; enfin la femelle (?) ne présente pas exactement les couleurs indiquées par Reichenow d'après Alexander (*Bull. Br. ornith. Club.*, 1891, t. XII, p. 12, et *Ibis*, 1902, p. 301); elle a la poitrine et les flancs d'un roux isabelle, un peu plus foncé que le milieu du ventre et n'offre point de points blancs sur les côtés de la poitrine; les parties supérieures du corps sont brunes et la queue est fortement teintée de rouge comme chez le mâle adulte.

Par son système de coloration, cette espèce me paraît rentrer plutôt dans le genre *Lagonosticta*, où Heuglin et Sharpe l'avaient placée, que dans le genre *Estrilda*.

96. *LAGONOSTICTA RARA* Autin.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 201, n° 1522.

Un spécimen.

97. *URÆGINTHUS BENGALUS* L.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 207, n° 1529.

Deux mâles et quatre femelles.

98. *HYPOCHERA ULTRAMARINA* Gm.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 213, n° 1534.

Un spécimen adulte de Djimtilo, 18 septembre 1903; un autre sans indication de localité. Ces deux Oiseaux par leur costume noir à reflets bleus et non pas verts appartiennent bien à l'espèce *H. ultramarina* de l'Afrique orientale et non à l'espèce *H. chalybeata* du Sénégal.

99. VIDUA SERENA L.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 217, n° 1539.

Un mâle pris à Bangui en août 1902. Yeux et pattes noirs.

100. STEGANURA PARADISEA L.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 223, n° 1542.

Un individu adulte de Krébédjé, novembre 1902.

101. PASSER GRISEUS V.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 230, n° 1545.

Un spécimen semblable à un exemplaire obtenu par M. J. Dybowski, à Brazzaville, en 1891.

102. SERINUS HARTLAUBI Bolle.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 272, n° 1599.

Un spécimen.

103. FRINGILLARIA STRIOLATA Licht.

Reichenow, *op. cit.*, t. III, part. 1, p. 292, n° 1625.

Un exemplaire de Fort-Archambault.

L'espèce était considérée jusqu'ici comme étant propre au Nord-Est de l'Afrique et à l'Ouest de l'Asie.

104. TURTUR SHELLEYI Salvad.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 411, n° 338.

Un mâle de Kousri, août 1903. Yeux roux, pattes claires.

105. OENA CAPENSIS L.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 2, p. 429, n° 355.

Un spécimen.

106. FRANCOLINUS ALTUMI Fisch. et Reichen.

Francolinus Hildebrandti Reichenow, *op. cit.*, t. II, part. 2, p. 477, n° 395 (part.).

Une femelle tuée à Beso, en septembre 1902. Yeux d'un brun roux pâle; pattes d'un jaune vif.

Cet Oiseau ressemble tout à fait, sauf pour les dimensions et pour la teinte générale des parties inférieures du corps, qui sont ici plus fortement lavées de roux, au Francolin qui a été décrit et figuré par MM. Fischer et Reichenow sous le nom de *Francolinus Altumi* et que, par la suite, M. Reichenow a cru identifier au *F. Hildebrandti* Cabanis. Évidemment

M. Reichenow doit, mieux que personne, être fixé sur la valeur de l'espèce qu'il a fait connaître, conjointement avec M. Fischer; néanmoins il me reste encore des doutes sur l'identité des deux espèces, doutes que vient augmenter l'examen du spécimen tué par M. le Dr Decorse. En effet, le *Francolinus Hildebrandti* figuré par Cabanis (*Journ. f. Ornith.*, 1878, p. 206 et 243 et pl. IV) et que M. Reichenow considère maintenant comme la femelle du *F. Altumi* Fisch. Reichen. (*Journ. f. Ornith.*, 1884, p. 179 et pl. II) a un éperon à une patte et diffère complètement par son plumage du *F. Altumi*, tandis que le spécimen qui a été obtenu par M. le Dr Decorse et qui est indiqué positivement comme une *femelle* n'a pas d'éperon et offre sur les parties inférieures du corps la teinte rousse que l'on observe généralement chez les femelles de Francolin, tout en ressemblant au mâle par le dessin de sa livrée. Il me semble donc plus naturel de supposer que ce dernier Oiseau est bien la femelle du *Francolinus Altumi*, qui alors constituerait une espèce distincte, tandis que la *F. Hildebrandti* serait le mâle non adulte d'une autre espèce.

Les dimensions de la femelle tuée par M. Decorse sont les suivantes : longueur totale, 0 m. 300; longueur de l'aile, 0 m. 170; longueur de la queue, 0 m. 080; longueur du tarse, 0 m. 050.

107. PLUVIANUS ÆGYPTIUS L.

Reichenow, *op. cit.*, t. I, part. 1, p. 150, n° 131.

Un spécimen.

Le Pluvian d'Égypte avait déjà été rencontré à Bangui par M. J. Dybowski en 1891.

SUR QUELQUES ÉLATÉRIDES DU MUSÉUM,

PAR M. H. DU BUYSSON.

Ayant reçu en communication quelques Élatérides restés indéterminés dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris, je suis heureux de donner à ce sujet quelques remarques qui serviront à l'histoire de cette famille de Coléoptères.

1. *Agriotes rubidicinctus* nov. sp.

Oblong, curvilinéairement rétréci en arrière à partir du milieu des élytres, ce qui lui donne une forme acuminée assez notable. D'un brun de poix, peu luisant, bordé plus ou moins largement, selon les individus,



Oustalet. 1905. "Catalogue des Oiseaux rapportés par la mission Chari-lac Tchad." *Bulletin du Muse*
um d'histoire naturelle 11(1), 10–16.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/137053>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/328441>

Holding Institution

University Library, University of Illinois Urbana Champaign

Sponsored by

University of Illinois Urbana-Champaign

Copyright & Reuse

Copyright Status: Not provided. Contact Holding Institution to verify copyright status.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.