

LETTRE N. 6

Paris, Juin 1905

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et correspondants que je me trouve de nouveau à Paris où je resterai quelques semaines pour aller ensuite passer l'été en Suède. Je reviendrai à Paris à la fin de la saison des champignons, et me ferai alors un plaisir d'indiquer les noms de celles des Gastéromycètes dont mes amis m'auront gratifié, au cours de la présente saison. J'aime à croire, que les personnes qui reçoivent mes publications, se rappellent que celles-ci leur sont envoyées pour encourager la récolte de spécimens. Ce n'est que par l'étude d'abondants matériaux provenant de localités différentes, que l'on est à même d'arriver à des conclusions correctes en ce qui concerne les espèces trouvées et leur distribution.

Voici les spécimens d'Europe qui m'attendaient à mon retour à Paris :

De **Madame A. Montague**, Angleterre : *Scleroderma cepa*, *Calvatia saccata*, *Lycoperdon gemmatum*, *Lycoperdon piriforme*, *Crucibulum vulgare*, *Cyathus striatus*, *Daldinea concentrica*.

De **M. Chas Crossland**, Angleterre : *Calvatia saccata* (lacunose) *Calvatia saccata* (even), *Lycoperdon gemmatum*, *Geaster triplex* (unopened).

De **M. Otto Harz**, en Bavière : (Récolte faite dans le Tyrol méridional). *Calvatia saccata*, *Calvatia caelata*, *Lycoperdon nigrescens*, *Bovista plumbea* : *Lycoperdon cepaeforme*, *Lycoperdon pratense*, *Lycoperdon cruciatum*. La dernière est une espèce rare en Europe. (Voir Myc. Notes n° 19). Mais évidemment le Dr Harz l'a trouvée en abondance, puisqu'il en a envoyé 3 collections. Le Dr Harz a envoyé également 3 collections de *Lycoperdons* qui me sont inconnus et, je crois, inédits. Ils seront décrits et figurés en détail dans les *Mycological Notes*. Le fait que le Dr Harz a trouvé ces nouveautés est remarquable, car les Vesse-de-loups d'Europe sont généralement bien connues. Je crois cependant que les régions montagneuses renferment encore quelques nouveautés.

Du **Rév. P. Meriano**, d'Espagne : De bons spécimens de *Polysaccum crassipes*, *Scleroderma cepa*, *Scleroderma Geaster* et *Bovistella Ohiensis*.

Bovistella Ohiensis est une espèce très commune aux Etats-Unis. Elle a été récoltée il y a longtemps, par Montagne, en Algérie et, plus récemment, par le professeur Patouillard, également en Algérie.

Ces spécimens n'ont pas la même couleur que les nôtres en Amérique, et vu l'absence de cortex, je ne suis pas sûr qu'elles sont identiques. Mais l'espèce du Révérend P. Meriano est sûrement la même ; *c'est du reste la première fois qu'elle est récoltée en Europe.*

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AT LOS ANGELES

JAN 20 1942

Du **Rév. P. D. G. Navas**, d'Espagne : *Bovista plumbea* (et quelques Polyporées et autres familles que je n'ai pas spécialement examinées).

Du **Rév. P. A. Breitung**, Danemark : *Trogia crispa*, *Panus stipticus*, *Discina venosa*, *Cyathus vernicosus*, *Crucibulum vulgare*, *Xylaria polymorphum*, *Scleroderma cepa*, *Lycoperdon piriforme*, *Lycoperdon pratense*, *Geaster triplex*, *Calvatia caelata*.

Le Rév. P. Breitung m'a envoyé deux champignons d'un grand intérêt, les premiers que j'en ai reçus d'Europe: 1° Une forme bronzée de *Lycoperdon piriforme*. Elle a les mêmes caractères, quant aux spores, au cortex etc., que la forme habituelle de cette espèce, mais en diffère par sa coloration cuivrée ; son aspect général est celui du *Lycoperdon cupricum* mais il a les spores lisses et un cortex différent. 2° Une petite espèce que je suppose être *Bovistella echinella*, mais qui nécessite d'autres investigations et comparaisons avant que j'en sois sûr. Elle a primitivement été décrite de l'Equateur sous le nom de *Bovista echinella*, mais je l'ai rarement reçue et seulement de stations très distantes l'une de l'autre, des Etats-Unis et du Mexique.

Cet échantillon est le premier qui m'est soumis d'Europe.

De **M. le Dr Otto Pazschke**, Leipzig : *Myriostoma coliformis*, champignon en général rare en Europe, *Geaster striatulus* (spécimens plus grand que d'habitude), *Geaster fimbriatus*, *Geaster rufescens*, *Geaster coronatus*.

De **M. Ch. Panau**, France : *Lycoperdon gemmatum*, *Geaster fimbriatus*, *Lycoperdon spadiceum* (spécimen beaucoup plus grand que celui que représente ma planche de cette espèce dans *Myc. Notes* n° 19).

Du **Rév. P. A. Luisier**, Tyrol : *Geaster rufescens*, *Lycogala Epidendrum*, *Lycoperdon gemmatum*, *Lycoperdon polymorphum*, *Lycoperdon spadiceum*, *Lycoperdon atropurpureum* (? — à l'état jeune), *Geaster fimbriatus* (forme habituelle), *Geaster fimbriatus*, forme que je n'avais pas encore vue et qui peut-être mériterait un nom spécial. Avec les caractères généraux de l'espèce, l'exoperidium est beaucoup plus lisse, plus mince et plus pâle que d'habitude ; l'endoperidium est également plus pâle de couleur.

Du **Rév. P. Paul Bovier-Lapierre**, Angleterre : *Bovista plumbea*, *Lycoperdon piriforme*, *Lycoperdon pusillum*, *Lycoperdon pratense*.

Du **Rév. P. T. Zimmermann**, Angleterre : *Lycoperdon piriforme*.

Les *Mycological Notes* n° 19 contiendront une monographie des espèces européennes de *Lycoperdons* ; le n° 20, celle des Etats-Unis.

Ces deux numéros étaient entre les mains de l'imprimeur quand j'ai quitté l'Amérique et parviendront sous peu à mes correspondants.

C. G. LLOYD

107, Boulevard Saint-Michel

PARIS, FRANCE



Lloyd, C. G. 1905. "Lettre No. 6." *Mycological writings of C. G. Lloyd* 2, 1–2.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/59611>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/328831>

Holding Institution

University of California Libraries (archive.org)

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.