

QUELQUES DENDROBIUM NOUVEAUX D'INDO-CHINE,

PAR M. F. GAGNEPAIN.

L'étude de ce genre, difficile par le grand nombre des espèces, m'a été notoirement facilitée par les excellents dessins analytiques de A. Finet et par les déterminations qui portent sa signature dans l'herbier du Muséum. Même après lui, je puis donner quelques descriptions d'espèces que je crois nouvelles après avoir comparé les plantes : 1° à celles de l'herbier général; 2° aux descriptions des 571 espèces de la monographie de Kränzlin, parue en 1910 dans le *Pflanzenreich*; 3° aux descriptions des nombreuses espèces parues depuis lors (plus de 200 seulement pour les terres avoisinant l'Indo-Chine).

Malheureusement l'élimination des 200 espèces n'a pu être complète, car certains recueils n'existent ni dans la riche bibliothèque du Laboratoire, ni dans celle plus importante du Muséum, ni même en France dans aucune bibliothèque publique.

Dans ces conditions, il existe quelque aléa dans la publication d'espèces nouvelles.

Je souhaite longue vie aux 11 suivantes, pour l'existence durable desquelles je n'ai pu faire davantage.

Dendrobium banaense Gagnep., n. sp.

Herba 13 cm. circiter alta. Caules ima basi paullulo bulbosi, supra teretes gracili, e medium dilatato-compressi, infra apicem aphylli (3 cm.), floriferi. Folia disticha, scalpelliformia, lineari-acuminata obtusa, vix falciformia, recurva, 20-25 mm. longa, 5-6 lata, 5-8 mm. remota, vaginis lamina destitutis oblique acutis. Inflorescentiæ terminalis flores albidii, centro purpurei, solitarii, gemmo minutissimo squamoso enali, minuti; pedicello 3 mm. longo, erecto. — Sepalum dorsale ovatum, subobtusum, 3.5 mm. longum, 1,75 latum, 5-nervatum; sep. lateralia sepalo dorsale similia, 3,5 mm. longa, 2,5 lata ad mentum 4 mm. decurrentia, 5-nervata. Petala ovato-lanceolata, 3.25 mm. longa, 2 mm. lata, 3-nervata, nervis anastomosantibus. Labellum longe (3 mm.) unguiculatum, ad mentum enascens, rhombeum, obtuso-retusum, margine undulatum, 7 mm. longum, 5 latum. Columna 1 mm. longa, valida, stelidiis apice ægre convexis,

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. II, n° 2, 1930.

appendicem dorsalem æquantibus; operculo conico-convexo, antice posticeque emarginato; mento incurvato, 4 mm. vix longo.

Annam : Ba-na, près Tourane, 1.000 m. alt., n° 7373, (Poi-lane).

De la section *Aporum*, du groupe des *Hemiphylla*, cette espèce se place vers le *Dendrobium acinaciforme* Roxb. dont elle diffère par de multiples caractères, ainsi que de toutes celles qui l'environnent.

Dendrobium Bonianum Gagnep., n. sp.

Pseudobulbi ovoïdeo-cylindrici, 5 cm. longi, 15-20 mm. crassi, in sicco costulati, tempore florum 3 cm. longi, apice bifoliati. Folia lineari-lanceolata, in petiolum canaliculatum attenuata, apice attenuato-obtusa vel acuta, 9-25 cm. longa, 2-5 cm. lata, membranacea petiolo 3-4 cm. longo. Inflorescentis solitaris terminalis, racemosa, floribunda, 4-15 cm. usque 18 cm. tempore fructuum longa; bracteis squamiformibus minutissimis, pedicellis 3-4 mm. longis, floribus numerosis usque 18, albo-viridibus, sed labello apice carminato, 20 mm. circa longis. Sepalum dorsale lineari-ovatum, obtusum, 10 mm. longum, 2.5 latum, 5-nervatum; lateralia triangulo-obtusa, 7 mm. longa, 4 mm. lata, ad mentum longe (4 mm.) decurrentia, 5-nervata. Petala lineari-lanceolata, obtusa, 7 mm. longa, 2-5 lata, 3-nervata. Labellum ambitu obovatum, 8 mm. longum, 6 latum, trilobum; lobi laterales obtusi, decurrentes, terminalis semi-orbicularis, vix emarginatus, 3 mm. latus, disco trilamellato, lamellis longitudinalibus supra tertiam partem infimam valde undulato-plicatis. Columna 3 mm. longa, stelidiis haud prominentibus, molliter undulatis, operculo obliquo, mox bifariam diviso, mento 3-5 mm. longo cum columna rectangulo. Capsula clavata, 14 mm. longa, 5-7 mm. lata, pedicello 3.5-4 mm. longo.

Tonkin : région de Hanoï, à Vo-xa, nos 2844, 3062 (Bon).

Ressemble au *D. canaliculatum* R. Br. par son aspect général, les 3 lames chiffonnées de son labelle et la taille de ses fleurs, mais en diffère : 1° par les feuilles larges, lancéolées, au nombre de 2 seulement ; 2° par l'inflorescence plus courte ; 3° par le labelle carminé au sommet et obtus ; 4° par les veines des lobes latéraux absentes, donc ni proéminentes ni colorées ; 5° par le labelle égalant les sépales et pétales.

Dendrobium cacuminis Gagnep., n. sp.

Rhizoma repens, pseudobulbis distichis, numerosis, densis comitatus. Pseudobulbi ovoïdeo-conici, 3 cm. longi, 1,5-2 cm. crassi, basi squamis latis, striatis, firmis, fragilibus cincti, foliis 2, apice coro-

nati. Folia lineari oblonga, basi attenuata, sessilia, apice obtusa leviterque emarginata, 11 cm. longa, 15-20 mm. lata, tenuiter nervibus in sicco striata. Inflorescentiæ 1-2, terminales ex axillis foliorum oriundæ, racemosæ, elongatæ, multifloræ, 25-30 cm. longæ, supra basin floriferæ, bracteis ovato-acutis, 3 mm. longis, persistentibus, pedicellis 15-17 mm. longis, erectis dein patentibus, floribus 12-17, apertis 4 cm. diam. — Sepalum dorsale lineare, obtusum, 25 mm. longum, 5 latum, nervis 5 parallelis; lateralibus simillima, 21 mm. longa, Petala sepalis conformia, leviter falciformia et lanceolata, 22 mm. longa, 5 mm. lata, nervis 5, parallelis. Labellum ambitu ovalum, 3-lobum, 12 mm. longum, 5 mm. latum, lobis lateralibus truncatis decurrentibus, terminali ovato-obtuso subrotundo, 5 mm. longo latoque, tenuiter piloso-papilloso; disco infra medium tricotato, costis lateralibus loratis ad basin canaliculatis 5 costis efficientibus, abrupte desinentibus, intermedia angustiora. Columna 6 mm. longa, stelidiis cum appendice dorsali cohærentibus, laminam triangulam figurantibus; operculo galeato, mento perbrevis, 1 mm. vix longo.

Annam : montée des Pics Lang-bian, 2.100 m. alt., n° 378 (Evrard).

De la section *Bolbodium*, cette espèce est remarquable par la présence constante de 2 feuilles. Elle diffère de *D. Schneideræ* Bailey : 1° par les feuilles 5 fois plus longues et 3-4 fois plus larges ; 2° par les inflorescences à fleurs plus nombreuses, jusqu'à 17 ; 3° par le pédicelle près de 4 fois plus long ; 4° les fleurs beaucoup plus grandes ; 5° le lobe terminal du labelle non en coussin.

Curieuse espèce ayant ses affinités plutôt avec ses congénères australiennes.

***Dendrobium dalatense* Gagnep., n. sp.**

Herba 30 cm. et ultra alta. Caules in parte media compressi, apice aphyli floriferique, obscure 4-anguli. Folia disticha, ensiformia, linearia, in uno latere 6 cm. remota, leviter falciformia, recurvaque, 4 cm. longa, 5-6 mm. lata, paullulo acuminata, obtusiuscula, cicatrice verticali ad apicem vaginarum, vaginis lamina destitutis, apice delloideis. Inflorescentia terminalis; flores albi solitarii gemmo squamoso 5 mm. longo, ovato-oblongo, bracteis imbricatis, brunneis, 3 mm. longis, supremis mucronatis enati; pedicello 1 cm. longo, patente, arcuato suffulti. — Sepalum dorsale, ovato-triangulum, sub-obtusum, 7 mm. longum, 4 mm. latum, 7-nervatum; sep. alleralia triangula, obtusa, 6 mm. longa, 4 mm. lata, ad mentum 13 mm. decurrentia, 7-nervata. Petala lanceolata, obtusa, 6 mm. longa, 2.3 lata, 3-nervata, nervo medio ramoso. Labellum longe cuneiforme, 15 mm. longum, infra apicem 7,5 mm. latum, apice rotundum superficie

emarginatum, nervis numerosis subparallelis percursum. Columna 1.5 mm. longa lataque, stelidiis subnullis ægre convexis, appendice dorsali triangulo brevi; operculo conico oblique truncato, mento lato falciforme, 13 mm. longo.

Annam : Lang-bian, à Dalat n° 40333 (A. Chevalier).

Cette espèce paraît se rapprocher du *D. scalpelliforme* T. et B. dont elle diffère : 1° par les feuilles longues de 4 cm. seulement; 2° par les fleurs blanches; 3° par les sépales non aigus; 4° par les pétales ni linéaires ni plus courts que les sépales; 5° par le labelle non crispé; 6° par la colonne jamais bicalleuse.

De la section *Aporum*, du groupe *Hemiphylla*, elle est remarquable par la grande distance qui sépare ses feuilles et par la longueur de son inflorescence terminale.

***Dendrobium Evrardii* Gagnep., sp. n.**

Caules debiles, patentes ascendentesque, 20-40 cm. longi; radices validi, caulium crassitudine; vaginæ sat laxæ, ore dilatatæ, cum foliis plus minusve nigro-hirsutæ. Folia lineari-oblonga, attenuato-obtusa, apice oblique emarginata, 6-7 cm. longa, 10-12 mm. lata; nervi crassiores 5. Inflorescentiæ ad caules foliacei enatæ, subterminales; flores solitarii albidii, majusculi, gemmo squamoso, oblongo oriendi, pedicello 35 mm. longo; bracteis 3-8 mm. longis, subacuminatis, nigro-hirsutis. — Sepalum dorsale oblongum, acutum submucronatum, 25 mm. longum, 8 mm. latum, nervis 7 anastomosantibus; sep. lateralibus triangulo-acuminatis, mucronatis; s. dorsale æquilongum, æquilatum, secus mentum gracilem 25 mm. decurrentia, nervis 7 anastomosantibus. Petala late obovata, apice rotunda, 28 mm. longa, 20-22 supra medium lata, nervis lateralibus ramosissimis. Labellum cuneiforme-obovatum, ad medium menti insertum, 3-lobum, 32 mm. longum, 24 latum, margine ad apicem crenulatum, multinervi; lobis lateralibus rotundatis decurrentibus, 10 mm. latis, lobo terminali ambitu orbiculari, sed conspicue 2-lobulato, 12 mm. diam.; nervo medio prominente. Columna 7 mm. longa, stelidiis subdeltoideis, margine dorsali conspicue 3-dentato, appendice dorsali minoribus; mento gracile, inflexo; 25 mm. longo.

Annam : Lang-bian, montée des Pics à 2.100 m., n° 389 (Evrard).

De la section *Nigro-hirsuta*, cette espèce a quelque ressemblance avec *D. longicornu*, mais elle s'en distingue au premier examen par son labelle non fimbrié, mais bilobulé au sommet. Il ne peut se rapporter ni à *D. Christyanum* Rehb., ni à *D. Williamsoni* Day et R. ni à aucune espèce dont j'ai vu les échantillons ou lu la description.

Dendrobium intricatum Gagnep., n. nov.; *D. hymenophyllum* (non Lindl.) var. *cambodicum* Finet; *D. uniflorum* Finet (non T. et B.); *D. prostratum* Cost. in Bull. Mus. Paris, 1917, p. 52 (non Ridley).

Caules aggregati, teretes vel sensim ad medium clavati et apicem attenuati, rimosi, alteri foliacei, alteri floriferi. Folia lineari-lanceolata, apice acuminata acutissimaque, basi attenuato-sessilia, 5-10 cm. longa, 10-15 mm. lata, 5-nervata. Inflorescentiæ racemi laterales brevi, 2-3-flori, pedunculo 1 cm. vix longo, bracteis 3 mm. longis, oblongis, pedicello 15 mm. longo, floribus roseis, haud inter majoribus. — Sepalum dorsale ovato-oblongum, obtusissimum, 10 mm. longum, 5 latum, 7-nervatum nervis anastomosantibus; sep. lateralibus subsimilia, sed ad mentum longe (7 mm.) decurrentia. Petala obovata, basi attenuata, apice valde rotunda, margine denticulata, 12 mm. longa, 6.5 lata, 6-nervata, nervis lateralibus ramosis. Labellum obovatum longe et anguste unguiculatum, apice rotundum, vix emarginatum, margine denticulatum, totum 25 mm. longum, 10 mm. latum, disco læniam longitudinalem leviter prominentem efformante; crista Λ forma ad basin unguem sita. Columna 3 mm. longa lataque, steliis ovatis, oblique emarginalis, appendice dorsali majoribus, mento 15 mm. longo, attenuato obtuso, incurvo semiorbiculari, longitudinaliter bicamerato, apice fistuloso; operculo orbiculari, leviter convexo, margine reflexo.

Cambodge : monts Camchay (*Pierre*); Préacan (*Harmand*).
Cochinchine : île Phu-quoc (*Pierre*) — Java?

Cette espèce a eu de multiples vicissitudes. Sur la foi de *Pierre* qui croyait posséder le *D. uniflorum* dans une plante de Java, *Finet* lui compara les échantillons ci-dessus et les nomma à tort *D. uniflorum* T. et B.

Comparant l'échantillon de Préacan, récolté par *Harmand*, avec *D. hymenophyllum* Lindl., il le reconnut différent de cette espèce et le lui annexa comme var. *cambodianum* Finet. Ce n'est pas *D. hymenophyllum* Lindl.

Tous les échantillons, ci-dessus désignés, sauf peut-être celui de Java, sont conspécifiques et ne sont ni *D. uniflorum* T. et B. ni *D. hymenophyllum*. Ce n'est pas *D. uniflorum*, car celui-ci est un *Aporum*. Ce n'est pas *D. hymenophyllum* qui a des grappes longues et multiflores. Ce n'est aucune espèce à moi connue par les échantillons ou la description. La forme du menton le place auprès de *D. hamatum* Rolfe, qui a des inflorescences plus floribondes, des feuilles plus larges, des sépales d'autre forme, des pétales aigus, un labelle environ 2 fois plus court, un menton épais et obtus.

Dendrobium langbianense Gagnep., n. sp.

Herba nana, 5 cm. alta. Caulis 15-20 mm. altus, vaginis foliaceis 3-4 vestitus, inflorescentiis 1-3, axillaribus coronatus. Folia 4-6, lineari-oblonga, apice leviter emarginata, 1-3 cm. longa, 3-5 mm. lata, intermedia majora. Inflorescentiæ 1, raro 3, subterminales, racemosæ 2-4 sæpe 3 cm. longæ, plurifloræ, bracteis ovato-acutis, 2-2.5 mm. longis, pedicellis 4.5 mm. longis, erectis deinde patentibus vel reflexis, floribus 4-5 pallidis, 1 cm. diam. Sepalum dorsale lineare, acutissimum, 8 mm. longum, 2 mm. latum, 5-nervatum, lateralia simillima sed secus mentum decurrentia. Petala lanceolata, acuta, 7 mm. longa, 2 mm. lata, 5-nervata. Labellum ovato-lanceolatum, basi cuneatum, 9 mm. longum, 5 mm. latum, haud lobatum, margine regulariter grosseque dentatum; disco longitudinale, 3-nervato, nervis leviter ad apicem divaricatis, abrupte ad tertiam partem supremam desinentibus. Columna brevis, stelidiis obtuso-emarginatis, appendice dorsali brevibus, operculo convexo, haud valde prominente, mento 5.5 mm. longo.

Annam : Lang-bian, n° 1936 (Eberhardt).

Cette espèce ressemble beaucoup à *D. porphyrochilum* Lindl. mais s'en distingue : 1° par le labelle fortement denté, ovale largement, à 3 nervures sur la zone médiane; 2° par les sépales 5-nervés; 3° par les gaines inférieures pourvues d'un limbe foliaire comme les autres. Par l'aspect, elle semble une forme naine du *D. eriæflorum* Griff., mais les pétales ne sont pas linéaires et le labelle n'est pas nettement trilobé. Au lieu que le labelle soit tronqué dans notre espèce, il est plutôt un peu aigu.

Dendrobium nhatrangense Gagnep., n. sp.

Rhizoma repens, gracilis, ad nodos radices caulesque emittens. Caules graciles, teretes, foliacei vel aphylli, 20-30 cm. longi; vaginæ laxæ, striatæ, purpurascentes. Folia 3-7, ad apicem sistencia, 15-20 mm. distantia, linearia graminiformia, longe acuminato-acuta, basi attenuata subsessilia, 5-7 cm. longa, 6-8 mm. lata, nervis striata. Inflorescentiæ flores solitarii, ad apicem caulium aphyllorum siti, vagina orientes, rosei, sat minuti, pedicello 5 mm. longo. — Sepalum dorsale oblongum, obtusum, 10 mm. longum, 3 mm. latum, 5-nervatum; sep. lateralia triangulo-acuta, 11 mm. longa, 4 lata, ad mentum 10 mm. decurrentia, 5-nervata. Petala linearia, 11 mm. longa, 2.5 supra medium lata, 3-nervata. Labellum subtrilobum vel rhombeum, unguiculatum, apiculato-obtusum, 12-13 mm. longum, 7.5 mm. latum, supra piloso-papillosum, margine sinuatum. Columna 2-5 mm. longa, stelidiis triangulo-sinuosis, appendice dorsale majoribus, mento 10 mm. longo, inflexo, subaculo, labellum ad tertiam

partem supremam gerente; operculo prominens obtuso, 1.5 mm. diam. 1 mm. alto.

Annam : n. de Ninh-hoa, versant S. E. du massif de la Mère et l'Enfant, prov. Nhatrang (*Poilane*).

Cette espèce nouvelle appartient au sous-genre *Grastlidium* et à la section *Angustifolia*. Elle diffère du *D. Cathcartii* Hook : 1° par la présence des fleurs sur des tiges aphylls ; 2° par des feuilles acuminées, non lobulées au sommet ; 3° par les fleurs rosées ; 4° par le labelle non oblong-lancéolé et sans carène médiane ; 5° par les stélidies à la fois acuminées et flexueuses.

***Dendrobium oxyanthum* Gagnep., n. sp.**

Herba 40-100 cm. alta, rupicola vel epiphytica. Caules ægre ad imam basin bulbosi, supra subcylindrici, vel ad medium leviter incrassati, foliosi, vel aphylli florigerique; vaginis apice sat apertis subinfundibuliformibus. Folia oblongo-lanceolata, basi attenuata, apice longe acuminata, acuta (haud biloba), 6-9 cm. longa, 12-17 mm. lata, membranacea. Inflorescentiæ laterales, racemosæ, 3-4 cm. longæ, rigide flexuosæ, bracteis lanceolato-acutis, 5 mm. longis, persistentibus, patentibus vel reflexis; pedicello cum ovario 14 mm. longo, erecto; floribus 2-8, 15-20 mm. longis, violaceis, odore pergrato. — Sepalum dorsale triangulo-acuminatissimum, 17 mm. longum, 5 mm. latum, 7-nervatum, lateralia subsimillima, sed basi ad mentum decurrentia, 12 mm. lata, 7-nervata. Petala lanceolata, acuminatissima 15 mm. longa, 4 mm. lata, 5-nervata. Labellum breviter unguiculatum, rhomboideum, abrupte acuminatissimum, subtrilobum, intus tenuiter papillosum, 15 mm. longum, 7-8 latum, disco transversali inter unguem et laminam elevato. Columna valida, stelidiis amplis, apice subbilobis, denticulatis; operculo mitreiformi, bilobo, papillis crystallino; mento lato, 8-9 mm. longo, obtuso.

Annam : col des Nuages, près Tourane, n° 7937; massif de Dong-che, prov. Quang-tri, n° 10620 (*Poilane*).

De la section *Pedilonum*, du groupe *Glomerata*, cette espèce paraît devoir se placer auprès des *D. violaceum* Kranzl., *cyanocentrum* Schlecht., *xanthomeson* Schlecht., *Victoriæ-Reginæ* Loher, *cavipes* J.-J. Sm. dans la classification de Krænzlin. Elle est très remarquable par ses sépales, pétales, labelle, tous finement acuminés; de là, son nom.

***Dendrobium Rivesii* Gagnep., n. sp.**

Caules erecti, basi ægre bulbosi, conspicue ad medium fusiformes, 40-50 cm. alti, leviter sulcati, vaginæ sat laxæ, scariosæ, fragiles. Folia lineari-lanceolata, basi attenuata, sessilia, apice acuminato-

acuta, 8-11 cm. longa, 12-14 mm. lata, 7-nervata. Inflorescentiæ racemus 7 cm. et ultra longus, subterminalis, bracteatus, bracteis 10-15 mm. longis, ovato-oblongis, pedicello 3-4 cm., floribus aurantiacis, 4 cm. diam. — Sepalum dorsale oblongo-lanceolatum, obtusum 20 mm. longum, 5 latum, 5-nervatum; s. lateralia triangula, 25 mm. longa, 5 ad basin lata, acuminato-acuta, 5-nervata. Petala obovato-lanceolata, 23 mm. longa, 7 lata, 5-nervata, nervis lateralibus ramosis. Labellum rhombeum, oblusissimum, obverse subtriangulum 2 cm. longum latumque, marginibus fimbriato-denticulatis ad basin inflexis, tubum efformantibus, ore tenuiter ciliatum, centro atropurpureum, basi purpureo striatum, disco lineis 3 prominentibus ornatum. Columna 4 mm. alta, stelidiis triangulo-retusis, apice emarginatis appendice dorsali minoribus, mento breve, 5 mm. longo, operculo prominente truncato, 1.5 mm. lato alloque.

Tonkin : résidence supérieure de Hanoi; Son-La, vallée de Nam-ma (Rives).

Cette espèce doit être placée dans la section *Crumenata*. Par son labelle simple, elle est voisine des *D. papilio*, *plebejum*, *gedeanum* d'après le travail de Krænzlin in *Pflanzenreich*. Je n'ai pu la rapporter à aucune des espèces contenues dans l'ouvrage, à aucune de celles nombreuses qui ont été publiées depuis lors (1910).

Dendrobium subterrestre Gagnep., n. sp.

Herba 15-20 cm. alta. Caulis uniarticulatus, apice bifolius fliferusque. Pseudobulbus cylindricus vel cylindro-conicus, 5-13 cm. sæpe 7 cm. longus, basi vaginis deltoideis, aphyllis, fragilibus mox evanescentibus vestitus. Folia terminalia 2, in petiolum 1-2 cm. longum attenuata, apice attenuato-obtusa, oblonga, sublanceolata, 9-10 cm. longa, 2-3 cm. lata, firma, subchartacea, nervis 2-3 mm., remotis striata. Inflorescentiæ subterminales, infra folia ex gemmo squamoso nascentes, 11-13 cm. longæ, racemosæ, multifloræ, bracteis 15 mm., supremis 7, longis, oblongo-obtusis, membranaceis, patentibus, pedicellis 2 cm. longis, ascendentibus, floribus 10-12, 15 mm. et ultra diam. Sepalum dorsale ovato-lanceolatum, obtusum, 9 mm. longum, 3 mm. latum, 5-nervatum; lateralia triangula, acuta, 9 mm. longa, 3 mm. lata, secus mentum decurrentia, 5-nervata. Petala lanceolato-obtusa, 3-nervata, nervis lateralibus ramosis, 7,5 mm. longa 2,6 mm. lata. Labellum 4 mm. unguiculatum, abrupte ovatum, trilobum, lobis lateralibus semi-orbicularibus, 2,4 mm. latis, lobo terminali semi-orbiculari, inconspicue emarginato, 4 mm. lato, disco lamellis longitudinalibus undulatis constituto. Columna 3.5 mm. longa, stelidiis amplis apice rotundatis appendicem dorsalem æquantibus; operculo convexo, 4-locellato, polliniis per paria 4 globosa ferruminatis.

Cochinchine : petite pagode de Ba-scu, prov. Tay-ninh sur les détritrus, sur les rochers ou arbres moussus, n° 285 (*A. Regnier*).

De la section *Dendrocoryne*, du groupe *Speciosa*, cette espèce se place non loin de *D. speciosum* Sm. Mais elle diffère du *D. speciosum*, qui a le lobe moyen du labelle aigu, du *D. delicatum* Bailey, qui l'a bilobé, du *D. falcorostrum* Fitzg. qui le porte en bec recourbé. La plupart des espèces de la section *Dendrocoryne* sont australiennes.



Gagnepain, F. 1930. "Quelques Dendrobium nouveaux d'Indo-Chine." *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle* 2(2), 232–240.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/214042>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/328860>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.