

LAMIAIRES NOUVEAUX DE L'OUEST AFRICAÏN [COL. CERAMB.]
(2^e NOTE 1).

Par P. LEPESME.

Sternotomis chrysopras Voet v. **Joveri**, *nova*.

Diffère de la forme typique par la plus grande extension du noir et du vert, le vert couvrant en particulier entièrement la marge basilaire du pronotum, la tache suturale médiane des élytres et, partiellement, sur ceux-ci, les taches préapicales et apicales, celles-ci non fusionnées, ainsi que la plupart des bandes transversales, tant noir qu'ochracées.

Type au Muséum de Paris : Côte d'Ivoire, Adiopodoumé (JOVER, O. R. S. O. M.). Un cotype de même provenance dans ma collection.

Sternotomis chrysopras Voet v. **reducta**, *nova*.

Comme la forme typique, mais les bandes transversales noires des élytres réduites, très étroites et densément maculées de jaune, leur marge suturale postmédiane par contre presque uniformément verte.

Type unique dans ma collection : Oubangui-Chari, Bukoko (ex E. S. A. A. T.).

Ceroplesis analeptoides, *n. sp.*

Long. : 32 mm. — Stature large, convexe. Noir peu luisant, sauf dans la région basilaire des élytres, ceux-ci ornés de deux larges bandes transversales ochracées, une prémédiane, une au quart postérieur, la région apicale également de cette couleur sous la forme d'une bande transversale dont le bord antérieur descend obliquement vers la suture.

Tête extrêmement finement et densément ponctuée. Lobes inférieurs des yeux petits, plus longs que larges, beaucoup plus courts que les joues. Tubercules antennifères formant entre eux un angle aigu, mais non réduit à une étroite fissure. Antennes fortes, près de moitié plus longues que le corps, le troisième article près d'une fois

1. Cf. *Bull. Mus. Paris*, (2) XIX, p. 340, 1947.

Bulletin du Muséum, 2^e série, t. XXII, n^o 1, 1950.

et demie aussi long que le quatrième. Pronotum fortement convexe sur le disque, pourvu latéralement d'un faible tubercule obtus émoussé, extrêmement finement et densément ponctué, avec en outre quelques points grossiers isolés sur le disque. Ecusson faiblement transverse, arrondi au sommet. Elytres larges et convexes, rapidement rétrécis et très rapidement déclives à partir du quart apical, assez grossièrement ponctués à la base, beaucoup plus finement et peu visiblement ensuite.

Type unique au Muséum de Paris (*ex* I. F. A. N.) : Côte d'Ivoire, Daloa (A. VILLIERS, VII-46).

Dans le tableau de détermination des *Ceroplesini* de mon collègue BREUNING (*Nov. Ent.*, 3^e *Suppl.*, I, p. 234), cette espèce vient se placer près d'*orientalis* Herbst ; elle s'en sépare aisément par ses élytres plus convexes et plus déclives en arrière, à bandes transversales claires plus larges et ochracées au lieu de rouge, à tache apicale obliquement transversale en atteignant partout la marge externe.

***Frea* (s. s.) *flavosternalis*, n. sp.**

Long. : 12 mm. — Stature en ovale allongé. Antennes un peu plus longues que le corps, éparsément frangées en dessous. le scape assez long, le troisième article un peu plus long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux sensiblement moins longs que les joues. Front pourvu d'une ponctuation dense et fine ; joues et occiput imponctués. Pronotum large, avec quelques fins points sur les côté du disque, pourvu de sillons transversaux très nets et d'une épine latérale assez large, même au sommet qui est nettement arrondi, très légèrement recourbée. Elytres très faiblement rétrécis dès la base, à ponctuation assez dense, grossière, les points devenant plus fins vers la suture et après le milieu.

Noir, à pubescence grise. Moitié antérieure des élytres marbrée d'ochracé, cette pubescence ochracée plus dense aussitôt après le milieu où elle forme une sorte de bande transversale ondulée n'atteignant pas tout à fait le tiers apical en arrière, le reste des élytres marbré de blanchâtre. Côtés du prosternum, du mésosternum et du métasternum revêtus d'une pubescence jaune. Moitié distale des articles antennaires, à partir du troisième, à pubescence brun foncé, leur moitié proximale à pubescence blanche.

Type unique au Muséum de Paris : Côte d'Ivoire, Adiopodoumé (JOVER, O. R. S. O. M.).

Dans le tableau de détermination des *Crossotini* de mon collègue BREUNING (*Nov. Ent.*, 3^e *suppl.*, II, p. 10), cette espèce vient s'intercaler entre *puncticollis* Jord. et *uniformis* Hintz, dont elle diffère au premier coup d'œil par ses élytres marbrés d'ochracé.

Elle est également très proche de *flavicollis* Auriv. dont je possède un exemplaire de Côte d'Ivoire, N'Dzida, mais s'en distingue aisément par son pronotum non garni de dense pubescence jaune pâle, à sillons transversaux profonds et nets, surtout le postérieur, et épine latérale large au sommet et non pointue.

Laboratoire d'Entomologie du Muséum.



Lepesme, P . 1950. "Lamiales nouveaux de l'Ouest africain [Col. Ceramb.] (2e note)." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 22(1), 92–94.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/237339>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/330332>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.