

HÉTÉROMÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

PAR M. M. PIC,

CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les Insectes ci-dessous nommés font partie des riches collections du Muséum d'Histoire naturelle⁽¹⁾, et plusieurs sont nouveaux.

HYLOPHILUS LATISSIMUS v. *OBSCURIPENNIS* Pic.

Le type provient des chasses de feu Germain en Bolivie; retrouvé au Chaco de Santa Fé, à Las Garzas, par E. R. Wagner.

***Hylophilus angulatipes* nov. sp.**

Oblongo-elongatus, subconvexus, fere opacus, griseo aut luteo-pubescent, nigropiceus, antennis pedibusque (femoribus posticis exceptis) testaceis, tibiis apice late dilatatis.

Oblong-allongé, subconvexe, presque opaque, revêtu de poils un peu soulevés jaunes en dessus, gris en dessous, noir de poix avec les antennes et les pattes, sauf les cuisses postérieures foncées, testacées. Tête subarquée postérieurement, densément ponctuée, yeux petits, écartés; antennes insérées en avant des yeux, assez courtes, peu épaisses à l'extrémité, à dernier article acuminé, 2^e article un peu épaissi, celui-ci avec 3, 4, 5 à peu près égaux; prothorax densément ponctué, subglobuleux, bien plus étroit que les élytres; élytres pas très longs, subparallèles, un peu rétrécis à l'extrémité, fortement et assez densément ponctués; pattes grêles, sauf les cuisses postérieures épaissies et les tibias de la même paire fortement et triangulairement élargis au sommet. Long. 2 millimètres environ.

Colonie du Cap, Steynsburg (R. Ellenberger).

Espèce des plus caractérisées par la particulière structure des tibias postérieurs; peut se placer près de *H. longipennis* Pic.

⁽¹⁾ Les cotypes de *Macratia impressiceps*, *Scraptia suturalis* et *Decorsei* se trouvent aussi dans la coll. Pic.

Formicomus conifer nov. sp. ♀.

Oblongus, nitidus, longe sat sparse griseo pubescens aut hirsutus, rufopiceus, pro parte obscurus, antennis pro majore parte femoribusque ad basin testaceis; thorace ad basin tuberculato.

Oblong, brillant, à pubescence grise irrégulièrement disposée avec quelques poils clairs dressés sur le corps, roux de poix, plus foncé par places, notamment sur les élytres, antennes, moins leur sommet obscurci, et base des fémurs testacés. Tête fortement et éparsément ponctuée, assez longue, très rétréci derrière les yeux; prothorax assez long; dilaté-arrondi en avant, étranglé près de la base, le milieu de la partie basale étant élevé en tubercule large et assez saillant; élytres bien plus larges que le prothorax, dilatés vers leur milieu, un peu rétrécis et subarrondis au sommet et, déprimés près de la base avec une callosité élevée et nette de chaque côté de l'écusson, irrégulièrement ponctuées, à pubescence grise non disposée en bandes; cuisses épaisses, tibias un peu sinués. Long. 4 millimètres.

Congo : Ogoué, à Lambaréné (D.-F. Ellenberger).

Voisin de *F. Kraatzi*, moins foncé, élytres plus larges et prothorax différemment tuberculé à la base.

FORMICOMUS OBCONICEPS Pic.

Le type unique ♂ provient des chasses de G. Vasse au Mozambique. La ♀ qui, comme le ♂, a une forme robuste, les élytres très bombées et un peu verdâtres, se distingue par les cuisses antérieures simples.

Un exemplaire a été recueilli à Lealui, sur le haut Zambèze, par V. Ellenberger.

Anthicus Ellenbergeri nov. sp.

Oblongus, satis latus, parum nitidus, breve griseo pubescens, rufo-testaceus, capite elytrisque ad basin late brunneis, palpis, pedibus abdomineque pallido-testaceis.

Oblong, assez large, peu brillant, orné d'une courte pubescence grise, roux-testacé, avec la tête et près de la moitié basale des élytres rembrunis, les palpes, pattes et abdomen étant de coloration un peu plus pâle. Tête grosse, subtronquée postérieurement, à ponctuation forte et dense, antennes assez grêles, pas très longues, subfiliformes; prothorax court, subtrapézoïdiforme, dilaté et subarrondi en avant, fortement et densément

ponctué : élytres larges et assez courts, atténués postérieurement, presque droits à la base, subarrondis au sommet, à peine déprimés vers la suture, fortement et peu densément ponctués ; pattes assez grêles. Long. : 3 millimètres.

Colonie du Cap : Steynsburg (D.-F. Ellenberger).

Ressemble à *A. Vassei* Pic, plus robuste avec les élytres non fasciés postérieurement.

Macratria impressiceps nov. sp.

Elongatus, nitidus, niger aut piceus, capite antice, epipleuris abdomineque, antennis palpis tarsisque testaceis, pedibus pro parte rufescentibus, pro parte brunneis.

Allongé, brillant, modérément pubescent de gris, noir ou noir de poix, devant de la tête, épipleures et abdomen roux, antennes, palpes et quatre tarsi antérieurs testacés, pattes en partie rousses, en partie teintées de brun. Tête finement ponctuée, nettement rétrécie en arrière et fortement impressionnée sur le vertex, yeux gros ; antennes grêles, à derniers articles pas très longs ; prothorax long, assez robuste, rétréci en avant, presque droit sur les côtés, impressionné à la base, fortement ponctué ; élytres plus larges que le prothorax, subparallèles, peu atténués postérieurement, à rangées de points médiocres ; pattes robustes, plus ou moins roussâtres, avec les cuisses ou les tibias parfois un peu rembrunis par places, tarsi antérieurs, intermédiaires et partie des postérieurs testacés. Long. : 5 millimètres environ.

Congo ; Sam Kita, dans l'Ogoué (R. Ellenberger).

Voisin de *M. laeviceps* Kr. ; distinct, à première vue, par la tête plus rétrécie en arrière et fortement impressionnée.

Scraptia lateralis nov. sp.

Oblongus, nitidus, luteo pubescens, rufo-testaceus, oculis nigris, elytris lateraliter brunneo notatis ; thorace dense punctato, ad basin mediocre bi-impresso.

Oblong, brillant, pubescent de jaune, roux-testacé avec les yeux noirs, les élytres médiocrement marqués de brun sur les côtés, suture en partie rembrunie. Tête assez courte, subarquée postérieurement, plus étroite que le prothorax, densément ponctuée ; antennes courtes ; prothorax court,

presque en demi-cercle, mais nettement rétréci en avant sur le milieu, densément ponctué, orné, de chaque côté de la base, d'une impression peu marquée; écusson grand, élytres un peu plus larges que le prothorax, oblongs, subarrondis au sommet, assez finement ponctués, à suture un peu enfoncée en avant et marqués d'une faible impression avant leur sommet. Long. : 4 millimètres.

Madagascar (Androy) à Ankobo (D^r J. Decorse).

Voisin de *S. Donckieri* Pic; plus robuste, prothorax plus brillant, autrement impressionné, élytres sans impression transversale, etc.

Scraptia suturalis nov. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, capite rufescente, elytris ad suturam et lateraliter nigro-notatis; thorace inimpreso.

Oblong-allongé, brillant, pubescent de gris, testacé avec la tête roussâtre, les yeux noirs, les élytres plus ou moins longuement marqués de noir sur les côtés et sur la suture, la bande suturale s'élargissant plus ou moins en arrière. Tête assez petite, densément ponctué; antennes courtes; prothorax en demi-cercle, rétréci en avant; densément ponctué; écusson grand; élytres à peu près de la largeur du prothorax, médiocrement ponctués, un peu atténués postérieurement. Long. : 3-3,5 millimètres.

Madagascar (Androy), Ambovombe (D^r J. Decorse).

Moins large que le précédent avec les dessins noirs bien nets sur les élytres, etc.

Scraptia Decorsei nov. sp.

Oblongus aut oblongo-elongatus, nitidus, griseo-pubescens, testaceis, aliquot pro parte rufescens, oculis nigris; thorace ad basin mediocre biimpreso.

Oblong, parfois oblong-allongé, brillant, pubescent de gris, testacé, parfois en partie roussâtre sur la tête, les antennes ou en dessous, yeux noirs. Tête relativement petite, densément ponctué; antennes courtes; prothorax pas très court, nettement rétréci en avant, densément ponctué, orné, de chaque côté de la base, d'une faible impression peu distincte; écusson petit; élytres peu plus larges que le prothorax, un peu rétrécis en arrière, finement ponctués. Long. : 3,5-3,8 millimètres.

Madagascar : Ambovombe (D^r J. Decorse).

Ressemble à *S. apicicornis* Pic, mais tête moins étroite, antennes n'ayant pas leur dernier article noir, etc.

BIOPHIDA IMPRESSA Pic.

Décrit comme *Scaptia* (*Bull. Mus.*, 1911, p. 215), mais doit rentrer dans le genre *Biophida* Pascoe. Varie par les élytres concolores (forme type) ou maculés de foncé sur les côtés (var. *nigronotata* Pic), ou encore par les élytres ornés d'une bande latérale noire, étranglée au milieu et n'atteignant pas le sommet des élytres (var. nov. *juncta*).

Des chasses de R. Ellenberger à Lambaréné au Gabon, région de l'Ogooué.

SPASTICA WAGNERI Pic.

Banderas, dans le Chaco de Santiago del Estero (E.-R. Wagner, 1910), de janvier à mars.



Pic, Maurice. 1920. "Hétéromères nouveaux ou peu connus." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 26(6), 500–504.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27200>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/333074>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.