

X. DESCRIPTION D'UN NOUVEAU MYMARIDE DES INDES ORIENTALES.

Par J. J. KIEFFER (*Bitsch*).

L'insecte décrit dans les lignes suivantes provient de Puri, côte d'Orissa, où il a été recueilli sur le carreau d'une fenêtre, le 13 Novembre 1910, par S. W. Kemp.

Gonatocerus longicrus, n. sp.

♀. Brun; vertex, hanches, pattes. angles postérieurs du pronotum, mesonotum sauf la moitié antérieure du lobe médian et l'extrémité antérieure des lobes latéraux, scutellum sauf le bord antérieur qui longe le mesonotum, pétiole, moitié antérieure de l'abdomen et segment anal jaunes. Tête beaucoup plus large que le thorax, un peu transversale. Vertex quadrangulaire, bordé latéralement par une arête qui le sépare de l'oeil. Yeux glabres. Ocelles en triangle, plus éloignés des yeux que l'un de l'autre. Joues faiblement striées, ayant la moitié de la longueur des yeux. Bouche petite. Entre chaque oeil et le vertex se trouvent deux fortes soies. Antennes insérées plus près des yeux que l'une de l'autre, composées de 11 articles, dont le 9^e et le 10^e sont parcourus par deux arêtes sensoriels, les 2 premiers grossis, le scape de moitié plus long que le pédicule, celui-ci obconique et de moitié plus long que gros; les 6 suivants d'égale grosseur et d'égale longueur, le 1^{er} en cône renversé, les suivants cylindriques, deux fois aussi longs que gros, 9^e et 10^e à peine plus longs que les précédents mais grossis, de moitié plus longs que gros, 11^e un peu plus gros que le 10^e et quatre fois aussi long, pointu à l'extrémité. Thorax deux fois aussi long que large; des soies grosses et peu longues se répartissent une à chaque angle postérieur du pronotum, une à l'angle postérieur de chaque lobe latéral du mesonotum et une de chaque côté en avant du lobe médian; le scutellum, le metanotum et le segment médian en sont dépourvus. Pronotum fortement découpé au milieu postérieurement, ses lobes s'arrêtent peu avant les écailles. Mesonotum triangulaire, un peu transversal, trois fois aussi long que le pronotum; sillons parapsidaux percurrents, très divergents en avant. Scutellum transversal, atteignant les $\frac{2}{3}$ du mesonotum. Segment médian aussi long que le mesonotum. Aile antérieure graduellement amincie proximale-ment, arrondie à l'extrémité, avec des soies denses et petites, les cils ne dépassent guère en longueur le tiers de la plus grande largeur de l'aile. Aile postérieure linéaire, amincie à l'extrémité, 20 fois aussi longue que large, munie d'un pétiole ayant le tiers de

sa longueur, cils du bord supérieur à peine 2 fois aussi longs que sa largeur, cils du bord inférieur 5-6 fois aussi longs que sa largeur. Les 4 hanches postérieures se touchent; trochanters distinctement biarticulés; tous les fémurs renflés en massue, moins gros distalement, deux fois aussi gros que les tibias, l'antérieur un peu plus court que le tibia, les 4 postérieurs dépassant à peine la moitié du tibia; éperon antérieur bilobé, métatarse antérieur avec un peigne; tarses de 5 articles subgéraux, métatarse postérieur dépassant peu la longueur de l'éperon du tibia. Pétiole un peu transversal; les tergites suivants portent de chaque côté 3 soies, au tergite anal les 2 soies externes des deux rangées sont 3-4 fois aussi longues que les autres. Tarière sortant de la base du 2^e tergite et ne dépassant pas l'abdomen. L. 0.9 mm.



Kieffer, J.-J. 1913. "Description d'un nouveau mymaride des Indes Orientales."
Records of the Indian Museum 9, 201–202.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41035>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/34732>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.