


DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRE DU GENRE *LYCUS*,
RECUEILLIE DANS LE CONGO FRANÇAIS PAR M. LE D^r J. KERANDEL,

PAR M. J. BOURGEOIS, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Lycus (*in sp.*) **Kerandeli** nov. sp.

♂. Oblongo-obovatus, nitidiusculus, glaber, fusco-niger, thorace elytrisque flavis, illo disco fere toto, his macula scutellari magna, subquadrata limboque marginali pone humeros incipiente et apicem ambiente nigris; capite rostroque nitidis, hoc longo, subcylindrico, medio paululum coarctato, antennarum articulo 3^o tribus sequentibus simul sumptis fere aequali; prothorace subquadrato, latitudine basali paulo breviori, apicem versus vix angustato, antice subrotundato, margine posteriori in medio subrecto, prope angulos utrinque sinuato, lateribus reflexo-marginatis,



Lycus Kerandeli Bourg. ♂, vu de trois quarts, en dessus.

rugulosis, dense sed brevissime sericeo-pubescentibus, medio haud coarctatis, subparallelis, disco longitudinaliter subcanaliculato, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis; scutello quadrato; elytris reticulato-punctatis, obsolete 4-costatis, basi latitudine prothoracis, pone humeros paulum inflatos usque ante medium ampliatis, dein apicem versus sensim attenuatis, margine anguste reflexo, fimbriato, costa prima haud longe pone basim spinam magnam, erectam, apice curvatam, nigram praebente (ita ut elytra bicornuta appareant); corpore subtus nitidiore; abdomine segmentis 8 conspicuis, penultimo postice integro, ultimo elongato-triangulari; forcipe apice acuminato, haud mucronato.

♀. A mare differt elytris minus dilatatis, elongato-subellipticis, costa prima spinam haud praebente, ad basim incrassata, quarta bene distincta; abdomine segmentis 7 conspicuis, ultimo ogivali.

Long. : 20–22 millim.; elytr. lat. hum. : 4 millim.; elytr. lat. max. : ♂, 14 millim.; ♀, 9 millim.

Congo français : Carnot (Haute-Sangha). D^r J. Kerandel, 1908 (1 ♂, 1 ♀). Muséum de Paris.

Cette remarquable espèce participe à la fois du *L. Kolbei* Bourg. [*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1889, p. 226 (♂) et *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1900, p. 143 (♀) du Transvaal et du *L. cornipennis* Bourg. [*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 659, ♂, ♀] de Sierra-Leone, tout en étant plus voisine de ce dernier. Elle présente, comme lui, un corselet presque carré, à peine transversal, des élytres à côtes presque obsolètes, largement relevés latéralement en gouttière chez le ♂, avec un forceps acuminé et droit à l'extrémité (chez *L. Kolbei*, le forceps est fortement recourbé au bout en un *mucro* aigu); mais les appendices élytraux (♂), au lieu d'être lamelliformes et de naître de la suture comme chez *cornipennis*, sont spiniformes et naissent de la première côte, comme chez *L. Kolbei*, en un point toutefois plus rapproché de la base.

Elle a été découverte par M. le Dr J. Kerandel, médecin-major des troupes coloniales, membre de la mission du Haut-Logone (Commandant Lenfant). Je me fais un devoir de la lui dédier.

CINQ NOUVEAUX HYLOPHILIDES D'AFRIQUE [Col.],

PAR M. PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les cinq espèces de Hylophilides que je décris ici font partie des riches Collections du Muséum de Paris; la première a été recueillie au mois de mars par l'infatigable Voyageur naturaliste Ch. Alluaud, lors de son voyage dans l'Afrique orientale allemande, à Kiboscho, dans la zone des forêts (1,700 m. alt.) du Kilimandjaro; les autres sont entrées au Laboratoire d'Entomologie avec la très importante Collection Fairmaire. Parmi les quatre espèces de cette dernière, trois sont originaires de Madagascar, dont deux ont été recueillies par Perrier de la Bathie; une provient de l'île Bourbon; c'est la première espèce connue de cette île.

Hylophilus Caroli nov. sp.

Oblongus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, testaceus, oculis nigris.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise en partie soulevée, entièrement testacé, un peu roussâtre sur la tête, avec les yeux noirs. Tête pas plus large que le prothorax, tronquée en arrière, à ponctuation très forte et rapprochée; yeux foncés, moyens, écartés entre eux et distants du bord postérieur de la tête; antennes longues, progressivement épaissies, à deuxième article plus gros et plus court que le troisième; dernier, court, obli-



1909. "Description d'une espece nouvelle de Coleoptere du genre Lycus, recueillie dans le Congo franYais par le Dr J. Kerandel." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 1909, 164–165.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27198>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/35993>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.