

inclinés en arrière, insérés sur les lignes ponctuées et sur les lignes de petits points des intervalles; soies des intervalles un peu plus longues que celles des lignes ponctuées; calus huméraux marqués. Écartement des hanches intermédiaires égal environ à la moitié du diamètre de la hanche. Saillie du premier segment de l'abdomen arrondie; stries fémorales divergentes, presque entières. Dernier article des tarses antérieurs du mâle denté en dessous.

Espèce voisine de *M. distinguenda* Comolli, plus allongée, probablement encore plus rapproché de *M. floridana* Fall, *Trans. Am. Ent. Soc.*, XXVI, 1899, p. 175, qui, d'après l'auteur, se distingue de *M. distinguenda* par ses élytres plus parallèles et relativement plus étroites par rapport au prothorax. Le *M. nidicola* est beaucoup plus allongé que *M. distinguenda*; ses élytres sont relativement larges par rapport au prothorax et ses tempes sont bien marquées.

Ce Lathridide est très intéressant par son mode d'existence; il vit en effet à titre de commensal dans le nid d'une Arachnide du Mexique, l'Araignée *Mosquero*, que M. Léon Diguët a rencontré dans le Michoacan aux altitudes de 2,000 à 2,500 mètres, espèce nouvelle à laquelle M. Eugène Simon a donné le nom de *Cænothele gregalis*⁽¹⁾,

COLÉOPTÈRES LAMPYRIDES RAPPORTÉS DE KOUY-T'CHEOU,
RÉGION DE PIN FA (CHINE),

PAR LES P. CAVALERIE ET FORTUNAT,
NOMMÉS ET DÉCRITS PAR ERNEST OLIVIER.

VESTA IMPRESSICOLLIS Fairm. Un ♂, deux ♀.

Grande espèce voisine de *V. Chevrolati* Cast. de Java, s'en distingue facilement par son abdomen entièrement d'un roux orangé.

VESTA RUFIVENTRIS Motsch. (*Cratolampis*). Un ♂.

Dans mon *Genera* des Lampyrides j'avais mis le genre *Cratolampis* de Motschulsky en synonymie de *Lucernuta* Cast., n'ayant pas à cette époque vu de *Vesta* de l'intérieur de la Chine. L'espèce rapportée par Cavalerie se rapporte bien à la description de l'auteur russe et nécessite la réunion avec les *Vesta* des deux espèces de *Cratolampis* (*rufiventris* et *flavicollis*). *Vesta rufiventris* Motsch. se rapproche beaucoup de *Vesta proxima* Gorb. qui habite les Philippines : la coloration est la même, sauf celle des tibias

⁽¹⁾ Sur l'Araignée *Mosquero*, Notes de MM. K. DIGUËT et Eug. SIMON, *Compt. Rend. Acad. Sc.*, 15 mars 1909, p. 735 et 736.

qui est plus obscure; les élytres sont plus rugueux et le prothorax est largement ogival, tandis que chez *proxima* il est acuminé dans le milieu de son bord antérieur de façon à former un angle assez saillant.

Vesta enervis nov. sp. Sept ♂.

Elongata, oblonga, nigra; antennis piceis, pubescentibus, prothorace duplo longioribus, articulis 3-10 longe triangulariter dentatis; prothorace squalide flavo, brevi, antice rotundato, carinato, rugose punctato, plaga quadrata basali lœvi; scutello triangulari, pallide flavo; elytris pallidis, prothorace latioribus, ampliatis, ellipticis, elongatis, crebre punctatis, trico-stulatis; pectore, coxis et femorum basi piceis; abdomine nigro, pygidio flavo, trisinuato; 5° et 6° ventris segmentis in medio plaga transversa lucida ornatis, ultimo emarginato, lucido, flavo. — Long., 16-17 millim.

Oblong allongé; corps noir, prothorax et élytres d'un jaunâtre pâle; antennes à rameaux longs, triangulaires aigus, prenant naissance sur toute la longueur de l'article; prothorax court, chargé d'une carène longitudinale, rugueusement ponctué antérieurement et offrant dans la partie médiane de sa base, au-dessus de l'écusson, une plaque quadrangulaire, lisse et généralement plus foncée; élytres longs, plus larges à leur base que le prothorax, s'élargissant régulièrement jusqu'à leur milieu et s'atténuant ensuite en forme d'ellipse allongée, densément ponctués, chargés de trois ou quatre côtes, la seconde à partir de la suture étant la plus saillante; abdomen noir en dessus, sauf le pygidium flave; ventre noir ou brun, les 5° et 6° segments ornés dans leur milieu d'une plaque transversale d'un flave brillant, le dernier entièrement flave.

LUCERNUTA AMPLISSIMA Ern. Oliv. Deux ♂.

Décrit sur un exemplaire de la collection Oberthur déjà rapporté de Kouy-Tcheou par l'abbé Largeau; se trouve aussi au Thibet.

LAMPORPHORUS MORATOR Ern. Oliv. Trois ♂.

Décrit sur des exemplaires du Musée de Gênes rapportés des Monts Carin, en Birmanie, par L. Fea. Les diverses espèces de *Lamprophorus* habitent l'Inde, la Chine centrale et les îles Ceylan, Bornéo, Sumatra et Java.

LAMPORPHORUS YUNNANUS Fairm. Quatre ♂.

Décrit du Yunnan.

Diaphanes exsanguis nov. sp. Deux ♂.

Elongatus, piceus; antennis prothorace longioribus, compressis; prothorace pallide flavo, parvo, brevi, subogivali, carinato, rugose punctato,

plaga quadrata juxta basali fere lævi et duabus plagis anticis vitreis munito; scutello triangulari, apice truncato, piceo; elytris pallidis, prothorace latioribus, elongatis, subparallelis, rugosis, tricostulatis; pygidio trisinuato, tribus ultimis ventris segmentis lucidis. — Long., 11 millimètres.

D'un brun de poix très clair en dessous; tête et prothorax d'un jaunâtre pâle. Les antennes, comprimées, plus longues que chez les autres espèces du genre, dépassent la longueur du prothorax; ce dernier est étroit, court, chargé d'une carène longitudinale assez saillante et grossièrement ponctué, sauf sur une plaque quadrangulaire au-dessus de l'écusson, qui est presque lisse. Les élytres sont allongés, rugueux, chargés de trois côtes longitudinales en partie obsolètes; le pygidium est sinué; les trois derniers segments du ventre sont ornés dans leur milieu d'une plaque lisse, brillante.

LUCIOLA OVALIS Hope. Trois ♂.

Espèce décrite du Népal, abondamment répandue dans l'est de l'Inde, la Birmanie, la Chine, l'Annam, la Cochinchine, le Tonkin, le Cambodge.

LUCIOLA CHINENSIS L. Deux ♂.

Espèce très commune dans l'Inde et dans toute l'Asie orientale, qui présente un grand nombre de variations comme ponctuations et nervures des élytres.

LUCIOLA ANCEYI Ern. Oliv. Un ♂, deux ♀.

Aussi en Birmanie, au Tonkin, au Cambodge.

Luciola ficta nov. sp. Trois ♂.

Oblonga, pubescens, ore piceo, capite et antennis nigris; capite sparsim profunde punctato; prothorace transverso, convexo, subquadrato, lateribus arcuatis, tenuissime punctato, pallide fulvo; scutello conico, punctato, pallido; elytris prothorace vix latioribus, oblongis, elongatis, rugose punctatis, obsolete costulatis, nigris, nitidis, fulvo anguste marginalis et puncto humerali fulvo notatis; pectore piceo, femoribus et tribus ultimis ventris segmentis albidis, ultimo segmento triangulari, apice truncato; tibiis, tarsis et primis ventris segmentis nigris. Longueur, 9 millimètres.

Antennes, tête et élytres noirs, ces derniers ornés d'une petite tache humérale fauve et étroitement bordés de cette même couleur sur tout leur pourtour; élytres rugueusement ponctués, n'ayant que des vestiges de côtes longitudinales; prothorax et fémurs d'un fauve blanchâtre; prothorax très

convexe recouvrant complètement la tête, pointillé, sillonné le long de sa base; tibias, tarsi et ventre, à l'exception des trois derniers segments, noirs.

Cette Luciole a la coloration des parties supérieures analogue à celle de *L. noctivaga* Ern. Oliv., mais elle s'en éloigne par la couleur noire de l'abdomen et par la forme de son prothorax convexe, quadrangulaire, au lieu d'être anguleux dans le milieu de son bord antérieur.

DIAGNOSES D'UN COLÉOPTÈRE *HYLOPHILUS*
ET DE CINQ COLÉOPTÈRES *ANTHICIDES* EXOTIQUES [*COL. HÉTÉROMÈRES*],

PAR MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les Insectes décrits ici font partie de la collection Léon Fairmaire acquise par le Muséum et proviennent : le *Hylophilus*, des chasses de Flohr au Mexique; l'*Anthicomorphus* et les *Tomoderus*, de Singapour⁽¹⁾; enfin l'*Anthicus*, de l'Afrique australe.

***Hylophilus peregrinus* nov. sp.**

Satis elongatus, subnitidus, griseo-pubescens, supra rufo-testaceus, capite postice scutelloque nigropiceis, elytris ad medium late fusco fasciatis, infra corpore nigro; antennis pedibusque testaceis et gracilibus.

Cette espèce un peu brillante est revêtue d'une pubescence grisâtre non soulevée, peu distincte; elle est noire en-dessous et presque entièrement testacée-roussâtre en-dessus; la tête, un peu plus large que le prothorax, est rousse en avant, noirâtre en arrière, subtronquée postérieurement; les yeux gris moyens sont très éloignés entre eux et ne touchent pas le bord postérieur de la tête; les antennes testacées sont assez longues, grêles à la base, un peu épaissies à l'extrémité; le 2^e article est plus court que le 3^e et le dernier à peine plus long que le précédent; le prothorax testacé est en carré long, fortement et densément ponctué, les élytres sont larges, pas très longs, fortement ponctués, dépourvus de dépression nette, testacés-roussâtres et ornés d'une large fascie médiane d'un brun noirâtre sinuée, plus large vers la suture; les pattes sont testacées et grêles. — Longueur, 2 millim. 5.

Mexique : Real del Monte.

Paraît voisin de l'*H. fragilis* Champ. (*ex description*); en différerait au moins par les élytres fasciés et les yeux moins grands.

(1) Peut-être ces espèces proviennent-elles des chasses de Raffray.



1909. "Coleopteres rapportes de Kouy-Tcheou (region de Pin-Fa, Chine), par les P. Cavalerie et Fortunat." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 1909, 247–250.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27198>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/35999>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.