

OBSERVAÇÕES SOBRE ALGUMAS AVES DO SUL DO BRASIL

KEYWORDS. Aves, Southern Brazil, new records.

A avifauna do sul do Brasil é uma das mais conhecidas no país, sobretudo graças as obras abrangentes de BELTON (1984, 1985) para o Rio Grande do Sul (RS) e de SICK *et al.* (1981) para Santa Catarina (SC). Nesta contribuição registra-se a ocorrência de espécies raras ou pouco conhecidas para esses Estados.

Anas leucophrys Vieillot, 1816 - marreca-de-coleira. Em 10.XII.1989, observamos um casal em um lago eutrófico, localizado 5km W de Capivari, Palmares do Sul, RS (30°07'S - 50°30'W, alt.: 10m). Poucas observações sobre esta espécie foram publicadas para o Rio Grande do Sul. BELTON (1984) menciona somente três registros neste século, todos do Sudeste do Rio Grande do Sul, um dos quais realizado durante o verão austral. E. P. Albuquerque (com. pessoal, 1992) registrou, em 11.VII.1976, um casal, na lagoa do Nicola, Estação Ecológica do Taim, (32°33'S/52°31'W - 32°34'S/52°33'W, alt.: 2m).

Leucopternis polionota (Kaup, 1847) - gavião-pombo-grande. Em 31. V. 1991, um exemplar foi observado no Morro da Igreja (28°07'S - 49° 27'W, alt.: 1806m), Parque Nacional de São Joaquim, São Joaquim, SC. A ave caçava em campo, à distância de um a dois quilômetros de uma mata. IHERING (1898, 1899) relatou a coleta de um exemplar no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina. Há registros de mais três observações, uma no Rio Grande do Sul (VOSS, 1982) e duas em Santa Catarina (SICK *et al.*, 1981). Embora seja considerada ave de floresta (SICK, 1985), sobrevoa o campo (VOSS, 1982).

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) - gavião-preto. No município de Bom Jesus, RS, observamos espécimens voando sobre campo: um destes a 7km W de Silveira, RS (28°38'S - 49°58'W, alt.: 1100m), em 15.VII.1989, e outro a 3km W de São José dos Ausentes, RS (28° 44'S - 50°05'W, alt.: 1200m), em 01.VI.1991. BELTON (1984) constatou a presença desta espécie em alguns pontos do Estado, mas não no extremo do Planalto, divisa com o Estado de Santa Catarina.

Hydropsalis brasiliiana (Gmelin, 1789) - curiango-tesoura. Em 11.X.1991, localizamos um macho numa clareira do bosque ao leste da sede da Estação Ecológica do Taim (32°32'S - 52°32'W, alt.: 5m), Rio Grande, RS. O bosque é caracterizado pela presença de *Ficus organensis* (Miguel) Miguel e *Erythrina cristagalli* Linnaeus, mas parcialmente alterado por pastoreio de gado. Trata-se de ave comum em diversas regiões do interior do Rio Grande do Sul (BELTON, 1984). Com esta observação no Taim, confirma-se sua ocorrência no litoral do extremo sul do Estado.

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) - caneleiro-de-crista. Uma fêmea, identificada conforme descrição de DUNNING (1982) e NAROSKY & YZURIETA (1987), foi observada em 25.XII.1989, na copa de uma árvore, no vale do Arroio Araçá (29°09'S - 51°21'W, alt.: 200m), Progresso, RS. Esta espécie é um visitante estival; raramente observada no Rio Grande do Sul, tendo sido registrada, até o momento, apenas para as regiões do Planalto e da Serra do Sudeste (BELTON, 1985).

Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) - triste-pia. Em 15.XII.1989, três exemplares, com plumagem de descanso, foram observados 25km NW de São Rafael, Quaraí, RS (30°18'S - 55°55'W, alt.: 200m), no oeste do Estado. Pousaram durante vários minutos sobre um arbusto a 40m de distância do arroio Pai-passo e se dedicaram à limpeza da plumagem, tendo sido identificados pelo desenho característico na cabeça. Esta ave

migratória da América do Norte passa o inverno boreal principalmente no norte da Argentina, sendo comum nos pantanais de Corrientes e Entre Rios, Argentina (RIDGLEY & TUDOR, 1989). Para o Rio Grande do Sul, há apenas uma observação realizada em 1914 (PINTO, 1944).

Habia rubica (Vieillot, 1817) - tiê-da-mata. Em 23 e 26.XII.1989, registramos a presença de um par e de suas vocalizações no subbosque denso de mata próxima à confluência do arroio Araçá com o rio Fão (29°09'S - 52°21'W, alt.: 200m), Progresso, RS. Como esse Thraupidae, frequentemente, oculta-se no interior da mata, dificilmente é observado. Até o momento, havia sido assinalado no RS apenas na mata do Parque Florestal Estadual do Turvo (ALBUQUERQUE, 1981) e nas escarpas centro-leste (BELTON, 1985).

Saltator similis D'Orbigny & Lafresnaye, 1837 - trinca-ferro de-asa-verde. Em 24 e 25.XII.1989, observamos um indivíduo em arbustos na orla da mata no vale do arroio Araçá (29°09'S - 52°21'W, alt. - 200m), Progresso, RS; foi identificado pela garganta branca, estria malar, e lista superciliar branca. Até o momento, foi constatada no nordeste do Rio Grande do Sul, onde ocorre sobretudo nas escarpas e para o oeste do Estado, especialmente na bacia do Rio Ibicuí (BELTON, 1985).

Agradecimentos. Ao Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) pelos auxílios concedidos. Trabalho realizado através do convênio da PUC/RS com a Universidade de Tübingen, Alemanha.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE, E. P. de. 1981. Lista preliminar das aves observadas no Parque Florestal Estadual do Turvo, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil. **Roessléria**, Porto Alegre, **4** (1): 107-122.
- BELTON, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Pt. 1. Rheidae through Furnaridae. **Bull. Am. Mus. Nat. Hist.**, New York, **176** (4): 369-636.
- . 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Pt. 2. Formicariidae through Corvidae. **Bull. Am. Mus. Nat. Hist.**, New York, **180** (1): 1-242.
- Dunning, J. S. 1982. **South American land birds**. Newtown Square. Harrwood. 351p.
- IHERING, H. von. 1898. As aves do Estado de São Paulo. **Revta. Mus. Paul.**, São Paulo **3**: 113-476.
- . 1899. As aves do Estado do Rio Grande do Sul. **Anuário do Estado do Rio Grande do Sul para o ano 1900**, Porto Alegre, **15**: 113-154.
- NAROSKY, T. & YZURIETA, D. 1987. **Guia para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay**. Buenos Aires, Asoc. Ornitológica del Plata. 340p.
- PINTO, O. M. de O. 1944. **Catálogo das aves do Brasil**. v.2. São Paulo, Secretaria da Agricultura, Indústria e comércio. 700p.
- RIDGLEY, R. S. & TUDOR, G. 1989. **The birds of South America**. v.1. Oxford University. 516p.
- SICK, H. 1985. **Ornitologia Brasileira; uma introdução**. v. 1. Brasília, Universidade de Brasília. 481p.
- SICK, H.; ROSÁRIO, L. A. & AZEVEDO, T. R. 1981. Aves do Estado de Santa Catarina. **Sellóvia**, Ser. Zool., Florianópolis, (1): 1-52.
- VOSS, W. A. 1982. Comunicação sobre a ocorrência do gavião-pombo, *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847), no município de Viamão, RS, Brasil. (Aves-Accipitridae). **Pesquisas**, Ser. Zool., São Leopoldo (33): 27-28.
- WILLIS, E. O. & ONIKI, Y. 1991. **Nomes gerais para as aves brasileiras**. São Paulo, Brasiliense, 79p.
- RAINER RADTKE¹ & ERICH WEBER²**. (1) Laboratório de Pesquisas Biológicas da Universidade de Tübingen na PUC/RS, Av. Ipiranga 6681, 90.610-001 Porto Alegre, RS, Brasil. (2) Lehrstuhl für Systematische Zoologie, Universität Tübingen, Auf der Morgenstelle 28, Tübingen, RF Alemanha.



Radtke, Rainer and Weber, Erich. 1993. "Observacoes Sobre Algumas Aves Do Sul Do Brasil." *Iheringia* 75, 189–190.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/107308>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/43199>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.