

profondément ombiliquée et moins profondément concave; mais ceci trouve naturellement son explication dans sa hauteur beaucoup inférieure : ses stries sont aussi plus régulières et plus fortes; le nombre de ses tours est moindre; son dernier tour est un peu plus descendant et plus convexe, ses taches sur le dernier tour mieux marquées, la suture est plus marquée aussi; son péristome est un peu plus flexueux et réfléchi. Mais son diamètre plus petit et sa hauteur proportionnellement beaucoup moindre la séparent, au premier coup d'œil, de l'*Helix* *Cabriti*.

E. M.

Description d'un **Unio** d'Australie,

PAR A. VILLA.

UNIO DANELLII, Villa.

Concha ovato-elliptica, crassiuscula, lævi, subrugosa, inflata, antice rotundata, postice obtuse angulata; natibus prominulis ad apices decorticatis; epidermide fusca, eradiata; dentibus cardinalibus lamelliformibus, erectis, triangularibus, obliquis, compressis; lateralibus lamellatis, longis rectisque; margarita cæruleo-alba. — Lat. 57, long. 92, crassit. 34. (Coll. Villa et Crosse.)

Animal sordide album.... ductis digestioris brevioribus quam in Unionibus Europæ.

Habitat in Australia meridionali, in rivulo prope Brunswick (1).

A. V.

Diagnoses **Molluscorum Novæ Caledoniæ**
et **Insularum Viti,**

AUCTORE H. CROSSE.

1. STOMATELLA MARIEL.

T. vix imperforata, depressa, sigaretiformis, transversim striis subdistantibus, sat numerosis impressa, lineis incrementi parum conspicue decussatula, parum nitens, rubro-fuscescens, late albo maculata; spira medio prominula, apice subrotundato; sutura leviter impressa; anfr. 5 convexiusculo-plani, primi 1 1/2 lævigati, rubro-fusci, ultimus vix descendens, magnus, supra valde planatus, depressus, ad peripheriam rotundatus, basi planiusculus, albidus, rubro-fusco variegato-maculatus; locus umbilici callo lato, albo circumscriptus; apertura oblique ovato-rotundata, intus margaritaceo-argentea; peristoma subincrassatum, marginibus callo albo, haud margaritaceo, crassiusculo, rimam umbilici fere omnino occultante junctis, columellari et basali subincrassatis, haud marga-

(1) Nous possédons, dans notre collection, un individu de la même espèce, recueilli dans la rivière Yarra (Victoria) : nous le tenons de notre honorable correspondant, M. J. Cox.

H. CROSSE.



Villa, Antonio. 1871. "Description d'un Unio d'Australie." *Journal de conchyliologie* 19, 328–329.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/52234>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/50907>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.