

Description d'un Lathridiide nouveau (Col.) du nord de l'Afrique.

Par le Dr. A. Chobaut à Avignon.

Metopthalmus (Bonvouloiria) Kabylianus, nov. spec.

— Corps allongé, déprimé, glabre, d'un ferrugineux clair, avec les antennes et les pattes jaunâtres, recouvert d'un enduit cryptogamique blanc qui tapisse la tête, le pronotum, les épaules, la marge latérale des élytres et tout le dessous du corps. Tête un peu plus longue que large; bord antérieur faiblement arqué; milieu du front avec deux petites carènes subparallèles; antennes courtes, dépassant peu le bord postérieur de la tête, de 9 articles: 1^{er} pentagonal, globuleux; 2^e un peu plus petit que le premier, cupuliforme; 3^e à 7^e petits, sphéroïdaux, à peu près égaux entre eux; 8^e et 9^e formant une massue nette, le dernier deux fois aussi long que le précédent. Pronotum un peu plus large que long, en hexagone irrégulier, la base plus large que le sommet qui est aussi large que la tête avec les yeux; côtés crénelés; deux côtes longitudinales médianes dénudées d'enduit crétaqué. Elytres subparallèles, pas plus larges que le corselet, très peu renflés, notamment à la base; sur chacun d'eux, trois côtes longitudinales, non compris une côte suturale, ces côtes peu élevées, à peine marquées; entre ces côtes, une double rangée de gros points, placés, au moins sur le premier intervalle, non côte à côte, mais chacun situé en regard de l'intervalle qui sépare les deux points latéralement voisins; angle huméral non saillant. — Long. 0·8 mill.

Notre collègue, M. L. Puel et moi, avons pris cette espèce, en Mai 1902, dans le département d'Alger, à Bou Bérak, près de Dellys, en tamisant du terreau de feuilles mortes dans la forêt qui domine la maison forestière de l'Aïn-Tisselitz.

Par ses antennes de 9 articles, *M. kabylianus* appartient au sous genre *Bonvouloiria* J. Duv. qui ne comptait jusqu'ici que deux espèces. Le tableau suivant permettra de distinguer les 3 espèces actuellement connues de ce sous-genre:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Forme générale allongée | 2 |
| 1' | Forme générale large. Elytres beaucoup plus larges que le corselet. | |
| | Côtes élytrales bien marquées. Long. 0·9 mill. | Revelierei Bel. |
| 2 | Elytres plus larges que le corselet. Côtes élytrales bien marquées. | |
| | Long. 1·2 mill. | niveicollis J. Duv. |
| 2' | Elytres pas plus larges que le corselet. Côtes élytrales peu marquées. Long. 0·8 mill. | kabylianus Chob. |



Chobaut, Alfred. 1906. "Description d'un Lathridiide nouveau (Col.) du nord de l'Afrique." *Wiener entomologische Zeitung* 25, 256.

<https://doi.org/10.5962/bhl.part.5399>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/43835>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.5399>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/5399>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.