

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES AFRICAINES NOUVELLES

DE LA FAMILLE DES

AVICULARIDÆ

PAR

M. E. SIMON.

Sect. **TRIONYCHÆ.**

1. **Aporoptychus** (1) **africanus** sp. nov.

♂ Ceph.th. long. 6,4^{mm}; lat. 5^{mm}. Abd. long. 6,5^{mm}. Pedes 1, 4, 2, 3. — Cephalothorax niger, marginatus, subtiliter coriaceus et opacus, antice et versus marginem obtusissime et inordinate granulosis. Oculi antici anguste et fere æque distantes, medii lateralibus fere triplo majores. Oculi postici, præsertim medii, minutissimi. Abdomen anguste ovatum, supra atro-testaceum et fulvo-pubescent, subtus obscure fulvum. Mamillæ pallide testaceæ. Chelæ sternum chelæque subtiliter coriaceæ, chelæ supra ad marginem interiorem transversim inordinate striolatae. Pedes parum robusti, femoribus atris, reliquis articulis fusco-rufescentibus, versus extremitates sensim dilutioribus. Pedes I, aculeo apicali tibiæ et metatarsi minutissimo excepto, mutici. Pedes II metatarso ad marginem anteriorem aculeis parvis minutis tribus armato. Pedes III patella tibia metatarsoque supra et extus numerose et inordinate aculeatis. Pedes IV patella et tibia mutica, metatarso subtus valde aculeato. Metatarsus I leviter fusiformis, inferne cum tarso breviter scopulatus. Pedes maxillares graciles et modice longi, femore curvato, tibia patella

(1) Cf. E. Sim., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1886. Le type de ce genre, *A. australis*, est originaire de Patagonie.

1/3 longiore tereti, tarso tibia saltem dimidio brevior angustior et parallelo, bulbo elongato in parte basilari cylindrato in parte apicali styliiformi et leviter curvato.

♀ (pulla). Ceph.th. long. 6^{mm}; lat. 4,5^{mm}. Abd. long. 7,5^{mm}; lat. 4,5^{mm}. Pedes 4, 1, 2, 3. — Cephalothorax obscure fuscus, subtilissime coriaceus fere lævis haud granulatus, parte cephalica latiore et convexiore. Chelæ robustiores haud striolatae. Abdomen oblongum supra fusco-lividum in lateribus et subtus sensim dilutius, parce fulvo-pilosum. Pedes breviores et robustiores, fulvi, tarsi, praesertim anticis, infuscatis. Tibia I mutica, tibia II aculeis setiformibus paucis, metatarsi I et II inferne aculeis validioribus 3 in serie unica et aculeis apicalibus tribus instructi. Pedes postici ut in mare aculeati. Sternum et partes oris obscure fulvo-testacea.

Congo : Landana.

Genus **ANCYLOTRYPA** nov. gen.

Aporoptycho valde affinis, cephalothorace simili. Area oculorum triplo latior quam longior, antice quam postice paulo angustior. Oculi antiqui subæqui (*fossor*) vel medii minores (*spinosa*), in linea parum sed evidenter procurva. Oculi postici inter se parum inæquales, utrinque parum disjuncti. Laterales postici anticis minores et ab anticis spatio diametro oculi paulo angustiore sejuncti. Pars labialis circiter æque longa ac lata. Chelæ, laminæ, sternum, pedesque ut in *Aporoptycho* sed tarsi posticis subtus et extus aculeatis. Ungues tarsorum cunctorum biserialiter dentati (*spinosa*) vel quatuor anticorum serie duplici dentium numerosum muniti sed ungues tarsorum quatuor posteriorum dentibus 2 vel 3 uniseriatis tantum instructi (*fossor*).

2. **Ancylotrypa fossor** sp. nov.

♀ (pulla) long. 12-15^{mm}. — Cephalothorax subtilissime coriaceus fere lævis, obscure fuscus, versus marginem posteriorem sensim dilutior. Abdomen longe oblongum, supra fusco-violaceum, in lateribus et subtus sensim dilutius et testaceum, parce fulvo-pilosum. Mamillæ pallide testaceæ. Sternum et partes oris obscure fulvae. Pedes robusti et breves, fulvi, femoribus, praesertim anticis, infuscatis atque olivaceis, aculeis ut in *Aporoptycho afri-*

cano sed tarsi postici subtus et extus in parte secunda inordinate et breviter aculeatis.

Congo : Landana.

3. *Ancylotrypa spinosa* sp. nov.

♂ long. 15^{mm}. — Cephalothorax elongatus, parum convexus, pallide fusco-piceus, tenuissime nigricanti-marginatus, subtiliter coriaceus, parte thoracica postice atque ad marginem parce nigro spinosa. Oculi quatuor antici fere æquidistantes, medii laterilibus fere duplo minores. Oculi postici anticis minores, medii subquadrati, laterales mediis paulo minores et ovati. Abdomen anguste ovatum atro-violaceum, antice, prope cephalothoracem, parce nigro-spinosum. Mamillæ testaceæ. Chelæ fusco-piceæ breviter nigro-setosæ, rastello ex dentibus sat longis haud elevatis composito. Partes oris sternum coxæque fulvo-rufescentia, breviter et parce nigro-setosa, partes oris omnino muticæ, sternum subtilissime transversim rugatum. Pedes graciles, sat longi, obscure olivacei, metatarsis tarsisque dilutioribus, setis nigris (in coxis trochanteribus et femoribus fere spiniformibus) vestiti, femoribus superne uniseriatim aculeatis, tibia antica tereti haud incrassata nec calcarata, inferne aculeis robustis biseriatis (5-4) armata, metatarso aculeis brevibus 4-3 armato. Pedes postici numerose aculeati. Pedes-maxillares graciles, tibia patella longiore vix crassiore et versus apicem attenuata, mutica sed inferne valde et longe ciliata, tarso parvo et obtuso, bulbi lobo subgloboso depressiusculo, spina lobo longiore apice setiformi.

Af. Austr. : Port-Elisabeth (Bairstown).

Nota. — C'est peut-être à côté de l'un des deux genres *Aporop-tychus* et *Ancylotrypa* que doit se placer le genre *Acontius*, trop brièvement décrit par le Dr Karsch in *Sitz. Berich. ges. Naturfr. Freunde*, Berlin, Av. 1889, p. 64.

Genus **HERMACHA** nov. gen.

Nemesiæ valde affinis sed fovea thoracica subrotunda, chelarum rastello parum distincto ex dentibus paucis longis et setiformibus composito, coxis pedum-maxillarium prope basin area

crebre et tenuissime spinulosa notatis, mamillis paulo longioribus, articulo ultimo medio vix brevior. — ♂ tibia antica haud incrassata, calcare apicali unico gracillimo armata.

4. **Hermacha caudata** sp. nov.

♂ long. 14^{mm}. — Cephalothorax fusco-rufescens versus marginem sensim dilutior, sat dense et longe fulvo-sericeo pubescens, parte cephalica modice convexa, fovea subrotunda. Oculi antiqui magni subæquales fere æquidistantes, medii rotundi, laterales late ovati. Medii postici elongati et recti a mediis anticis et lateralibus posticis fere æque et anguste separati, laterales postici mediis evidenter minores sed lateralibus anticis multo minores. Abdomen anguste ovatum, atrum, subtus dilutius, nigro fulvoque hirsutum. Chelæ, sternum, partes oris pedesque fulvo-rufescentia. Tibia parvis 1^a apice haud incrassata, calcare apicali simplici spiniformi acuto et paululum arcuato, subtus aculeis robustis (calcarum fere similibus) 3-1 et intus aculeis similibus binis armata. Metatarsi quatuor antiqui evidenter scopulati, aculeis plurimis armati. Tarsi graciles, quatuor antiqui scopulis integris sat densis vestiti, postici subtus crebre setosi utrique vix distincte et parce scopulati. Tibiæ metatarsique quatuor posteriores numerosissime aculeati. Patella 3^a parvis extus aculeis trinis uniseriatis et intus aculeis binis, patella 4^a parvis intus aculeo unico armata. Pedes-maxillares tibia patella longiore et vix crassiore, leviter ovata, intus in parte secunda aculeis 4-5, extus aculeo apicali unico, armata, tarso parvo et obtuso, bulbi lobo longe piriformi, spina lobo longiore et basin tibiæ fere attingente, gracillima et setiformi sed apice obtusa.

Af. Austr. : Baie de Delagoa (Peringuey).

Genus **SPIROCTENUS** nov. gen.

Nemesiæ affinis. Cephalothorax similis, sed area oculorum convexiore et vix 1/3 latiore quam longiore. Oculi subsimiles, spatium inter laterales diametro postici paulo angustius, laterales antiqui a margine frontali anguste separati. Chelarum rastellum (in mare) ex dentibus parvis robustis et uniseriatis compositum. Tarsi quatuor antiqui et metatarsi in parte apicali (in mare) sat crebre scopulati, tarsi postici setosi, cuncti mutici. Ungues

superiores serie dentium numerosorum sinuosa, fere **S** designante muniti, dentibus versus basin longioribus, unguis, inferior minutissimus.

5. **Spiroctenus personatus** sp. nov.

♂ long. 20^{mm}. — Cephalothorax læte ravidus, parte cephalica nigra muculam triquetram formante, medio thoracica infuscata, fovea sat magna et profunda subrotunda. Oculi medii antici rotundi, inter se quam a lateralibus paulo remotiores, laterales mediis majores subrotundi, medii postici parvi elongati et recti a mediis anticis quam a lateralibus posticis paulo remotiores. Laterales postici mediis majores sed lateralibus anticis fere duplo minores. Abdomen breviter ovatum, supra atrum, nigro setosum crebre et inordinate fulvo-punctatum et guttulatum, subtus pallide testaceum. Chelæ nigræ. Sternum partes oris coxæque pallide fulvo-rufescentia. Pedes fusco-olivacei, patellis dilutioribus et rufescentibus. Tibia paris 1ⁱ apice vix incrassata, calcaribus vel spinis robustis et curvatis intus ad apicem armata, subtus aculeis robustis 3-1, intus aculeis binis et extus aculeo unico armata. Metatarsi quatuor antici scopulati et aculeis robustis plurimis armati, metatarsi 1ⁱ paris versus basin glaber compressus et leviter curvatus. Tibiæ metatarsique sex posteriores numerosissime aculeati. Patella 3ⁱ paris aculeis parvis et robustis trinis uniseriatis et intus aculeo graciliore, patella 4ⁱ paris intus aculeo gracili, armatæ. Pedes-maxillares tibia patella longiore vix crassiore, apicem versus attenuata, extus mutica, intus prope apicem aculeis debilibus binis tantum armata, tarso parvo, apice leviter emarginato, bulbi lobo lato depressiusculo piriformi, spina gracillima et acuta lobo paulo longiore.

Af. Austr. : Baie de Delagoa (Peringuey).

Sect. **DIONYCHÆ.**

Genus **CYPHONISIA** nov. gen.

Cephalothorax crassus, postice et præsertim antice attenuatus, parte cephalica (saltem in ♀) sat convexa, fovea profunda leviter recurva. Area oculorum convexa, haud longior quam latior

antice quam postice paulo angustior. Oculi duo antichi magni, ovati et obliqui in margine antico siti, spatio diametro oculi fere duplo latiore separati. Reliqui oculi ab anticis parum remoti, medii anticis paulo majores et multo minus disjuncti. Oculi postici parvi, in linea transversa subrecta, utrinque subcontigui, interior exteriore minor. Chelæ ad apicem rotundæ, haud productæ, rastello ex dentibus parvis 8-10, regulariter uniseriatis composito, instructæ. Pars labialis non multo latior quam longior, leviter attenuata et truncata, mutica vel fere mutica. Coxæ pedum-maxillarium prope basin spiculis paucis uniseriatis munitæ. Sternum planum, paulo longius quam latius. Pedes 4, 1, 2, 3, breves, robusti et parum inæquales, antichi parce postici numerose aculeati, tarsi cuncti metatarsique quatuor anteriores omnino mutici et usque ad basin crasse scopulati, metatarsi postici tantum ad apicem scopulati. Scopulæ tarsorum quatuor posteriorum vitta setosa sectæ.

Gen. *Idiommata* Auss. differt chelis rastello instructis, a *Barychelo* E. Sim. differt apice chelarum haud producto, ab *Idiophthalmate* Cambr. differt fovea thoracica recurva haud procurva, a *Pisenore* et *Encyocrypta* E. Sim., differt area oculorum antice quam postice angustiore et dentibus rastelli minutissimis

6. **Cyphonisia obesa** sp. nov.

♀ Ceph.th. long. 7,5^{mm}; lat. 6^{mm}. Abd. long. 11^{mm}; lat. 8^{mm}. Pedes 4, 1, 2, 3. — Cephalothorax obscure fuscus, opacus, longe fulvo-cinereo pilosus, parte cephalica et area oculorum antice setis nigris validis instructis. Oculi antichi ovati et obliqui, spatio diametro oculi fere duplo latiore sejuncti. Oculi ser. 2^a rotundi, anticis paulo majores et spatio dimidio diametro oculi haud latiore sejuncti. Abdomen magnum, obscure fulvum, fusco-punctatum et reticulatum, parce pubescens. Chelæ validæ subnigræ. Sternum, partes oris, pedes-maxillares pedesque pallide fusco-rufescentia, tibiis metatarsisque posticis ad basin obscurioribus et subannulatis. Tibiæ quatuor anticæ aculeis setiformibus paucis tantum armatæ metatarsi quatuor antichi omnino mutici usque ad basin crasse scopulati. Patella III antice aculeis brevibus binis, patella IV aculeo unico armatæ, tibiæ metatarsique postici sat numerose aculeati.

Congo. : Riv. Quiliou.

Genus **PISENOR** nov. gen.

Barychelo E. Sim. sat affinis, cephalothorace oculisque similibus, sed oculis anticis transversim latius remotis et spatio diametro oculi multo latiore separatis, chelis ad apicem rotundis haud productis, rastello, ex dentibus sat longis uni vel biseriatis composito, armatis, parte labiali plus triplo latiore quam longiore ad apicem linea transversa minute spinulosa instructa, lamine prope basin spiculis paucis et inordinatis munitis, sterno haud longiore quam latiore, tarsis cunctis scopulatis, scopulis posticorum vitta lata setosa longitudinaliter sectis, anticorum integris vel linea setosa exillima et parum distincta sectis. — ♂ tibia antica apice calcaribus duobus, inferiore altero majore et arcuato, armata.

7. **Pisenor notius** sp. nov.

♀ Ceph.th. long. 6,5^{mm}; lat. 5,4^{mm}. Pedes 4, 1, 2, 3. — Cephalothorax obscure fulvus, parce et sat longe pilosus, parte cephalica lineis longitudinalibus obscurioribus 5 vel 7 antice leviter divaricatis et evanescentibus, parte thoracica lineis radiantibus parum expressis notatis. Tuber oculorum convexum, evidenter longius quam latius et antice quam postice paulo latius. Oculi antici late ovati spatio diametro oculo vix dimidio latiore sejuncti. Oculi ser. 2^a anticis majores, spatio dimidio diametro oculi haud latiore sejuncti. Spatium inter oculos ser. 1^a et 2^a diametro oculi circiter 1/3 angustius. Abdomen oblongum, supra fuscum subtus sensim dilutius et fulvum, fulvo-pubescens. Chelæ fere nigræ. Sternum, partes oris pedesque omnino lurida. Tibia et metatarsus paris 1ⁱ mutici. Tibia paris 2ⁱ aculeis longis biseriatis 3-2 subtus armata. Metatarsus paris 2ⁱ prope basin aculeis binis iniquis armatus. Pedes postici numerose aculeati. Scopulæ tarsorum cunctum linea setosa (in tarsis anticis exillima) longitudinaliter sectæ.

Zambèze.

8. **Pisenor nigellus** sp. nov.

♂ Ceph.th. long. 7,5^{mm}; lat. 6,4^{mm}. Pedes 4, 1, 2, 3. — Cephalothorax nigellus, pilis adpressis longissimis obscure cinereis, setis nigris validis intermixtis, dense vestitus, parte cephalica

parum convexa, fovea magna transversa levissime recurva. Tuber oculorum convexum, vix longius quam latius et postice quam antice vix latius. Oculi antichi oblongi, spatio diametro oculi duplo latiore sejuncti. Oculi ser. 2^æ anticis majores rotundati et convexi, spatio dimidio diametro oculi angustiore sejuncti. spatium inter oculos ser. 1^æ et ser. 2^æ diametro oculi angustius. Abdomen breve, fulvo et nigro longissime et dense hirsutum. Chelæ parvæ nigræ, dentibus rastelli numerosis inordinatis et gracilibus. Sternum pedesque fusca, longe cinereo-hirsuta. Tibia I calcare apicali inferiore valido et arcuato, ad apicem aculeis validis et obtusis duobus instructo et calcare interiore duplo minore infra directo et inæqualiter biaculeato instructa, tibiæ I et II aculeis inferioribus 3-2 et interioribus 2 armata. Metatarsi I et II usque ad basin scopulati, I prope basin aculeo unico, II prope medium aculeis 2 vel 3 instructi. Pedes postici numerosissime aculeati. Scopulæ tarsorum anticorum integræ posticorum sectæ. Pedum-maxillarium tibia patella vix 1/4 longior haud crassior versus apicem leviter attenuata, intus aculeis 4-5 inordinatim biseriatis armata, tarso parvo angusto ad apicem inæqualiter bilobato, bulbi lobo parvo depresso-rotundo, spina lobo plus duplo longiore, ad radicem sat crassa longe et sensim attenuata ad apicem setiformi et tibiæ tertiam partem basilarem attingente.

Congo : Landana.

Genus **LOXOMPHALIA** nov. gen.

Selenocosmiæ Auss. affinis, differt metatarsis cunctis usque ad basin crassissime scopulatis et scopulis pedum posticorum articulis latioribus, patella cum tibia 4ⁱ paris evidenter longiore quam patella cum tibia 1ⁱ paris. *Phoneiusa* Karsch (1) valde affinis differt oculis anticis majoribus, mediis lateralibus paulo majoribus et paulo remotioribus, spatio inter laterales anticos et posticos diametro oculi evidenter angustiore, fovea thoracica magna et lata atque in femina tarso pedum-maxillarium normali (in *Phoneiusa* tarso superne valde tumidulo).

(1) Karsch, Berl. entom. Zeitschr., 1884, p. 348 et 1886, p. 83. — Type *P. Greeffi* Karsch, de l'Île Sao-Thome, comprend encore *P. Bütteneri* Karsch d'Afrique occidentale et *P. Belandana* Karsch du pays des Niam-Niam.

9. **Loxomphalia rubida** sp. nov.

♀ Ceph.th. long. 26,2^{mm}; lat. 22,6^{mm}. Abd. long. 28^{mm}; lat. 18,5^{mm}. P.m. 38^{mm}. Pedes I 62,6^{mm}; II 55,5^{mm}; III 53,2^{mm}; IV 75^{mm}. — Corpus pedesque fusco-rufescentia, breviter et dense fulvo-ferrugineo pubescentia et parum dense setosa, corpore subtus paulo obscuriore, partibus oris rufescentibus intus rufo-pilosis. Oculi medii antici lateralibus paulo majores et inter se paulo remotiores, spatio diametro oculi circiter $1/4$ angustiore sejuncti. Medii postici parvi, elongati et postice acuminati. Patella cum tibia I evidenter brevior quam patella cum tibia IV.

Zanguebar intérieur.

10. **Pelinobius** (1) **gabonicus** sp. nov.

♀ Ceph.th. long. 25^{mm}; lat. 20,4^{mm}. Abd. long. 28^{mm}; lat. 18^{mm}. P.m. long. 37^{mm}. Pedes I 62,7^{mm}; II 57^{mm}; III 51,8^{mm}; IV 67,5^{mm}. Corpus pedesque fulvo-rufescentia, breviter et dense pallide cervino pubescentia et setis tenuibus parce hirsuta, coxis sterno ventreque paulo obscurioribus, partibus oris rufescentibus intus rufo-pilosis. Oculi medii antici lateralibus vix majores, spatio diametro oculi vix $1/3$ angustiore sejuncti, medii postici anticis plus quadruplo minores, ovati et obliqui. Patella cum tibia I paulo brevior quam patella cum tibia IV.

Gabon.

Genus **HARPAXOTHERIA** nov. gen.

Selenocosmia valde affinis, cephalothorace simili, oculis anticis in linea minus procurva (margine antico mediorum longe ante centrum lateralium siti), oculis posticis lineam transversam paulo angustiore quam lineam anticam formantibus, pedibus aculeis apicalibus metatarsorum et tiliarum (binis) tantum armatis, pedibus 4ⁱ paris longioribus quam pedibus 1ⁱ paris, tibia cum patella 4ⁱ paris haud (♀) vel vix longiore quam tibia cum patella 1ⁱ paris, scopulis metatarsorum quatuor posticorum

(1) *Pelinobius* Karsch, in Fischer, Reise in d. Massai Land., 1885, type *P. muticus* Karsch, du pays des Massai.

crassissimis, articulo paulo latioribus atque integris, scopulis metatarsi 3ⁱ paris vix $\frac{1}{3}$ basilari attingentibus, scopulis metatarsi 4ⁱ paris medium haud attingentibus.

Pelinobio Karsch valde affinis, imprimis differt oculis mediis posticis ab oculis mediis anticis quam a lateralibus posticis remotioribus et scopulis metatarsi 4ⁱ paris articulo latioribus.

11. *Harpaxotheria antilope* sp. nov.

♀ Ceph.th. long. 22,3^{mm}; lat. 18,8^{mm}. P.m. 34,4^{mm}. Pedes I 53,5^{mm}; II 50^{mm}; III 48^{mm}; IV 63,2^{mm}. — Cephalothorax fere niger dense et sat breviter fulvo-ferrugineo pubescens. Tuber oculorum sat convexum, saltem $\frac{1}{3}$ latius quam longius. Oculi antici magni, fere æquidistantes, spatiis dimidio diametro oculi vix latioribus sejuncti, medii lateralibus evidenter majores. Laterales postici ab anticis spatio diametro magno oculi parum angustiore remoti. Abdomen ovatum, fulvo-ferrugineo pilosum. Pedes sat longi fusci, dense et breviter fulvo-ferrugineo pubescentes et parce setosi, patellis et tibiis anticis lineis dorsalibus glabris tenuibus munitis. Tibiæ cum patellis I et IV fere longitudine æquæ et cephalothorace vix breviores.

Congo : Tomby.

12. *Harpaxotheria gracilipes* sp. nov.

♂ Ceph.th. long. 12^{mm}; lat. 9,9^{mm}. Pedes I 45,2^{mm}; II 42,3^{mm}; III 41,5^{mm}; IV 49,5^{mm}. — Cephalothorax obscure fuscus, dense et longe fulvo-cervino pubescens. Parte cephalica sat attenuata et parum convexa. Tuber oculorum sat convexum, haud $\frac{1}{3}$ latius quam longius. Oculi antici parum disjuncti, medii lateralibus saltem $\frac{1}{3}$ majores et inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Laterales postici ab anticis spatio diametro oculi evidenter angustiore sejuncti. Abdomen breve, atrum, longe ferrugineo-hirsutum. Pedes fusci, fulvo-cervino pubescentes, longissimi et parum robusti, metatarsis tarsisque gracilibus. Tibia cum patella IV paulo brevior quam tibia cum patella I. Tibia I haud calcarata. Tibiæ I et II inferne ad apicem aculeis 8-10, in seriem transversam arcuatam ordinatis, tibiæ III et IV aculeis apicalibus binis, metatarsi cuncti aculeis apicalibus parvis 2 vel 3 tantum armati. Pedes-maxillares graciles, tibia patella saltem

1/3 longiore, gracili et tereti subtus longe crinita, tarso parvo apice obtuso et levissime emarginato, bulbi lobo sat minuto et subgloboso, spina lobo multo longiore usque ad basin gracili.

Congo : Landana.

13. Harpaxotheria ectypa sp. nov.

♂ Ceph.th. long. 11^{mm}; lat. 9^{mm}. P.m. 17^{mm}. Pedes I 31,8^{mm}; II 28,5^{mm}; III 25,2^{mm}; IV 33,4^{mm}. — Cephalothorax fere niger, sat longe pallide fulvo-pubescent. Tuber oculorum valde convexum, haud 1/3 latius quam longius, antice setis erectis validis munitum. Oculi antiqui æqui seu medii vix minores, medii inter se paulo latius quam a lateralibus remoti, spatio diametro oculi vix angustiore sejuncti. Laterales postici minuti et obliqui, ab anticis spatio diametro oculi evidenter angustiore sejuncti. Abdomen breviter ovatum longe fulvo-pubescent. Coxæ sternumque obscurius et olivaceo-pubescentia. Pedes fusco-rufescentes, cinereo-albido et fulvo sat longe hirsuti. Tibia cum patella IV cephalothorace paulo longior et tibia cum patella I vix longior. Pedes-maxillares tibia patella longiore sed haud crassiore, versus apicem levissime attenuata, subtus longe ciliata, tarso parvo apice truncato inæquiter bilobato et scopulato, bulbi lob parvo rotundato et depresso, spina lobo multo longiore gracili et acutissima, valde recurva.

Abyssinie (Raffray).



Simon, Eugène. 1889. "Descriptions d'espèces africaines nouvelles de la famille des Aviculariidae." *Actes de la Société linnéenne de Bordeaux* 42, 405–415.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/54850>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/55583>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.