Description d'un Fulgoride nouveau de France [HÉMIPT.]

par le Dr G. HOWÁTH.

Metropis forficula, nov. sp. — *Nigra, nitidula, brachyptera; capite fusco-ferrugineo, vertice latitudine sua paullo brevior, antice rotundato, medio quam lateribus paullo longior, basi distincte bifoveolato; fronte latitudine sua inter antennis paullo longior, convexiuscula, carinula mediana obsoletissima tantum inferne supra clypeum distinguenda instructa, lateribus leviter curvatis; clypeo nigro, medio carinato; antennis fusco-ferrugineis; pronoto vertice paullo brevior, utrinque versus medium foveola minuta instructo, postice leviter sinuato; elytris incompletis, coriaceis, basin segmenti antepenultimi abdominis haud superantibus, apice rotundatis; pedibus flavo-testaceis, femoribus posticis basin versus nigricantibus; segmento genitali magno, extruso, aperturam rotundatam praebente, superne medio angulato-exciso et utrinque in cornu longiusculum, introrsum, et sursum vergens, apicem versus sensim gracilescens et retrorsum curvatum productum, subtus sinuato, lateribus rectis; stylis genitalibus longis, sigmoideis, a basi usque ad medium fortiter divergentibus, dein leviter introrsum et mox leviter extrorsum et sursum curvatis, dimidio apicali ferrugineis; tuba anali subtus appendicibus longis coadunatis perpendicularibus instructa.* — ♂. Long. : 2,5 mill.

Cette espèce est très remarquable par le pygophore du mâle prolongé en deux cornes recourbées vers l'intérieur en forme de crochets et dirigées un peu en haut.

L'unique exemplaire a été trouvé par M. le Dr A. CHABAUT, le 17 mai 1906, à l'endroit dit « Le Four à Chaux », entre les communes des Angles et de Rochefort-du-Gard (Gard).

Description de Microlépidoptères nouveaux d'Algérie

par P. CHRÉTIEN.

Anacamptis acutella, nov. sp. — Enverg. : 6,5-7 mill. — Ailes supérieures larges, blanchâtres, très légèrement ocracé jaunâtre, parsemées d'écailles brun ocracé ou noirâtres, formant de vagues bandes obliques, basilaire, anté- et postmédiane, et une large tache vers l'apex. La teinte ocracé jaunâtre s'étend sur les bandes obliques et forme des

1908. "Description d'un Fulgoride nouveau de Franco." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1908, 165–165. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.5609>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/37020>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.5609>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/5609>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.