claires que le reste du corps. La forme en est étroitement allongée, assez longuement atténuée en arrière. La ponctuation de la tête et du pronotum est peu visible sous la fine pubescence grise qui les couvre. Les élytres sont densément et finement striolés en travers, sans autre strie que la suturale.

Un exemplaire de Wellington (Nouvelle-Zélande), communiqué par M. ANDREWES.

**Description d'une espèce nouvelle de Psélaphide [COL.]
d'Italie centrale**

par A. RAFFRAY.

Aphiliops crassipes, nov. sp. — *Oblongus, antrorsum valde attenuatus, rufo-testaceus, antennis pallidioribus, breviter, tenuiter et sublente pubescens. Caput minutum, triangulare, latitudine aequilongum, subdeplanatum, in fronte supra antennarum insertionem foveis duabus, vertice simplice; infra tumidum et lateribus sulcatum, setis elongatis et apice clavatis ornatum. Oculi mediocres, postice et infra siti. Antennæ graciles et breves, articulis duobus primis validis, 2 ovato et paulo majore, sequentibus minutis, moniliformibus, 10 leviter transverso, 11 magno, ovato. Prothorax elongato-cordatus, capite haud latior, sed duplo longior, ante basin lateribus leviter coarctatus et supra medio angulatim obsolete impressus, sulco transverso obsoletissimo, sinuato. Elytra prothorace vix longiora, subtriangularia, apice duplo latiora, basi attenuata, humeris nullis et lateribus rotundatis, margine postica arcuatim emarginata, stria suturali valida, dorsali nulla, foveis basalibus deficientibus. Abdomen elytris paulo longius, postice attenuatum, sat forte marginatum; segmento 1^o dorsali magno, caeteris brevibus; ventralibus 1 brevissimo, 2 maximo, 3-5 brevibus, 6 magno. Metasternum magnum et simplex. Pedes sat breves; coxis posticis parum distantibus; femoribus validis, intermediis et præsertim anticis clavatis; tibiis leviter sinuatis, pone medium crassioribus.*

♂. *Femoribus anticis et intermediis magis clavatis; segmentis ventralibus 6 magno, transversim impresso, 7 transversim triangulari et late operculato.*

♀. *Segmento ultimo ventrali (sexto) præcedentibus majore, transverso et apice subrotundato.*

Long. : 1,00-1,10 mill.

Cette nouvelle espèce, la seconde du genre *Aphiliops*, présente avec l'*Aubei* de Corse des différences très notables et qui pourraient, dans une certaine mesure, être considérées comme génériques : les hanches postérieures notablement écartées dans *Aubei* sont presque contiguës dans *crassipes*; la tête est unie et les fossettes du vertex font défaut; le sillon transversal du prothorax est presque entièrement effacé. Le rapprochement des hanches postérieures tendrait à faire rentrer cet insecte dans le genre *Zibus*; mais la tête est beaucoup plus courte, le 1^{er} segment dorsal est grand et les élytres n'ont pas de strie dorsale; en sorte que cette forme un peu aberrante a moins d'affinités avec les *Zibus* qu'avec les *Aphiliops*, et qu'il est préférable de la faire rentrer dans ce dernier genre.

Cet insecte semble fort rare; il n'apparaît qu'après les premières pluies de septembre. Je n'en ai rencontré que cinq exemplaires dont trois ont été trouvés sous des pierres, au milieu de très petites fourmis d'un testacé pâle; les deux autres ont été pris en tamisant la terre au pied des arbres, dans un bois de Chênes.

Subiaco, province de Rome.

D'après M. DODERO, un autre exemplaire a été pris par MM. SOLARI au Valle Lucano, près de Naples.

Rectification au sujet de *Coenina dentataria* Swinh. [LÉP.]

par J. DE JOANNIS.

M. le D^r H. REBEL (de Vienne), auquel j'avais envoyé un exemplaire des notes que j'ai publiées récemment sur cette espèce, m'a fait observer qu'il avait déjà fait connaître la curieuse chenille en question, il y a deux ans (*Verh. der k. k. zool. bot. Ges. in Wien, Sitzungsber. der Sektion für Lep.*, 1906, p. 234), et dont il a donné une photographie grandie, p. 236, d'après un spécimen conservé dans l'alcool. C'est donc incontestablement lui qui a la priorité pour la publication de cette chenille. M. le D^r REBEL avait considéré cette espèce comme inédite et l'avait nommée *Orsonoba aegyptiaca*. Ce nom doit être mis en synonyme de celui de SWINHÖE, qui date de 1904. Le genre *Orsonoba* Wlk. est d'ailleurs bien voisin de *Coenina* Wlk.

M. le D^r REBEL avait publié dans le même recueil, même année, p. 78, une espèce très voisine de *C. dentataria*, provenant de Pales-

1908. "Description d'une espece nouvelle de Pselaphide d'Italie centrale."
Bulletin de la Société entomologique de France 1908, 265–266.
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.5616>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/37020>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.5616>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/5616>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.