NOUVEAUX MALACODERMES EXOTIQUES (1) [Col.]

PAR

M. PIC

Calochromus tibialis n. sp.

Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-violaceus, thorace, scutello, femoribus elytrisque ad basin breve testaceis; tibiis sulcatis; elytris costulatis.

Allongé, subparallèle, brillant, noir violacé avec le prothorax, les cuisses, l'écusson et l'extrême base des élytres testacés. Tête petite, impressionnée entre les yeux; antennes longues, un peu épaissies à la base, foncées, avec le premier article vaguement marqué de roux à la base; prothorax court, peu élargi en arrière, impressionnée près de chaque angle; élytres un peu plus larges que le prothorax, à peine élargis avant le milieu et rétrécis ensuite, costulés, d'un noir violacé avec l'extrême base, y compris les épaules, testacées; pattes pas très longues, cuisses testacées, tibiais foncés un peu aplatis et sillonnés, les antérieurs en outre étant faiblement arqués. Long. 10 millim., îles Salomon.

Très voisin de *C. humeralis* Pic; en diffère, à première vue, par la coloration testacée moins étendue sur la base des élytres et par toutes les cuisses entièrement testacées.

Chauliognathus albithorax n. sp.

Elongatus, parum nitidus, niger, antennis palpisque pro maiore parte rufescentibus, thorace abdomineque albo testaceis.

Allongé, peu brillant, noir, base des palpes et antennes, moins les 1^{ers} articles, foncés, roussâtres, abdomen et prothorax d'un blanc testacé. Tête pas très large, impressionnée sur le vertex; antennes assez longues et grêles avec le 1^{er} article peu épaissi; prothorax luisant et de coloration pâle, presque carré, plus étroit que les élytres; élytres pas très larges et assez longs, atténués en arrière, un peu brillants à la base, subopaques et

(1) Toutes les nouveautés figurent dans la collection Maurice Pic.

à vague transparence brune en arrière; abdomen testacé, plus pâle à la base, cupuliforme au sommet; pattes foncées, à pubescence claire, un peu robustes. Long. 15 millim. Nouvelle-Guinée.

Cette espèce, voisine de *C. Le Moulti* Pic, est très distincte par la coloration foncée des élytres qui, en outre, sont plus densément ponctués postérieurement.

Chauliognathus Lajoyei n. sp.

Satis robustus, postice valde attenuatus, parum nitidus, niger, thorace rubro, nigro maculato, satis elongato; elytris brevibus, postice valde attenuatis et dehiscentibus, abdomine, apice excepto, luteo marginato.

Assez robuste, très atténué en arrière, avec les élytres longuement déhiscent, peu brillant, noir avec le prothorax rouge, maculé de noir de la façon suivante : une macule médiane transversale sur le bord antérieur et une autre sur le milieu, deux macules distantes à la base. Tête longue; prothorax un peu plus long que large, relevé sur les bords, presque droit sur les côtés; élytres nettement plus larges que le prothorax à la base, assez courts, très atténués et déhiscent à l'extrémité; abdomen foncé, marginé, à l'exception du sommet, de jaune, dernier segment sinué à l'extrémité; pattes robustes, les postérieures plus longues avec les tibias subsinuées. Long. 12 millim. Amérique méridionale : Montevideo (ex coll. LAJOYE).

Voisin de *Ch. Schuppeli* Bourg., pattes plus longues et coloration très différente.

Dasytes Armitagei n. sp.

Elongatus et angustatus, nitidus, griseo pubescens, antice fusco hirsutus, nigro-viridescens, antennis ad basin, pedibus thoraceque lateraliter testaceis.

Allongé et étroit, orné d'une pubescence grise, écartée, avec des poils foncés dressés sur l'avant-corps, brillant, noir verdâtre, antennes à la base, pattes et côtés du prothorax testacés. Tête assez grosse, biimpressionnée entre les yeux; antennes robustes, testacées à la base, rembrunies ensuite; prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant, à ponctuation très forte et écartée sur le disque; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, à peine élargis après le milieu puis courtement

rétrécis à l'extrémité, à ponctuation écartée, moins forte vers l'extrémité; pattes médiocres. Long. 4 millim., Amérique méridionale : Bogota (ex coll. ARMITAGE).

Voisin de *D. Baeri* Pic, mais élytres moins larges par rapport au prothorax, ce dernier étant moins rétréci aux extrémités et testacé sur les côtés.

Dasytes aplocnemiformis n. sp.

Satis latus et convexus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, nigro-aeneus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus.

Assez large et convexe, brillant, orné de longs poils gris, en partie redressés, noir bronzé avec les pattes et antennes en partie et variablement roussâtres. Tête large, à ponctuation pupilleuse; antennes plus ou moins rousses, à base obscurcie, courtes avec les derniers articles élargis; prothorax presque de la largeur des élytres, court, subarqué sur les côtés, rétréci en avant, à ponctuation en partie pupilleuse; élytres assez larges et peu longs, surtout ♀, courtement atténués au sommet, rebordés sur les côtés et à la suture, à ponctuation forte et rapprochée avec des petites rides transversales; pattes robustes, variablement et en partie roussâtres avec les tarses d'ordinaire de coloration plus claire. Long. 4-4,3 millim., Indes : Khasia Hills.

Cette espèce, très distincte par son faciès qui rappelle les espèces du genre *Aplocnemus* Steph., peut prendre place provisoirement près de *D. discretus* Gorb.

1915. "Nouveaux Malacodermes exotiques." *Bulletin de la Société zoologique de France* 40, 95–97. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.6450>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/22166>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.6450>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/6450>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.