

Description d'une espèce nouvelle de Coccinellide  
de l'Afrique du Sud

par le Doct. A. SICARD.

---

**Platynaspis Silvestrii** n. sp.

= *Telsimia tetrastica* Csy. 1899. Sac 13. 1928.

*Breviter ovata; supra nigra, pilis erectis grisescentibus dense vestita, nitida; elytris maculis binis fulvis ornatis; subtus piceo-nigra; pedibus nigris, tibiis tarsisque dilutioribus. Long. mm. 1,5.*

En ovale court; d'un noir luisant en dessus, avec une pubescence héressée grise et dense. Tête grosse à ponctuation bien marquée et médiocrement dense; yeux petits, arrondis; antennes et palpes bruns. Corselet transversal, à cotés presque droits, avec tous les angles arrondis, à bords légèrement explanés, à ponctuation simple, fine et dense. Elytres de la largeur du corselet à la base, parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis largement arrondis jusqu'à l'extrémité, à ponctuation plus forte que celle du corselet, plus accusée le long du bord externe; noirs à deux tache d'un jaune d'ocre: tache 1 situé aux deux cinquièmes de la longueur, un peu plus rapprochée de la suture que du bord externe, à peu près carrée, couvrant environ le quart de la largeur; tache 2 en carré transversal, très rapprochée de la suture, situé aux trois quarts de la longueur et couvrant environ la moitié de la largeur.

Dessous d'un brun noir foncé luisant, à ponctuation assez forte et peu dense, plus grosse sur le métasternum. Plaques abdominales n'atteignant pas tout à fait le bord postérieur du premier segment abdominal.

Pieds noirs avec les tibias et les tarse brunatres.

Patrie: Klein Constancia: Colonie du Cap.

Cette espèce m'a été communiquée par le prof. Silvestri, à qui je suis heureux de la dédier, qui l'a reçu avec rameaux de mûrier infestés de *Diaspis pentagona* Targ.

Appartient au groupe des *Platynaspis* de petite taille telles que *japonica* Wse. et *ceylonica* Wse.; de la même forme que la première de ces deux espèces dont la distinguent facilement ses élytres tachés de jaune. Le dessin est à peu près le même que celui de *P. capicola* Crotch, mais le corselet est sans tache, la taille beaucoup plus petite (un millimètre et demi), la pubescence dressée et la forme plus ovalaire.

---



1910. "Description d'une espece nouvelle de Coccinellide de l'Afrique du Sud (Platynaspis silvestrii, sp. n.)." *Bollettino del Laboratorio di zoologia generale e agraria della R. Scuola superiore d'agricoltura in Portici* 4, 118-119.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34389>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/70410>

**Holding Institution**

Smithsonian Libraries and Archives

**Sponsored by**

Smithsonian

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: NOT\_IN\_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.