

DESCRIPTIONS
D'ARACHNIDES NOUVEAUX
DU GENRE ERIGONE

Par M. E. SIMON.

(Séance du 8 novembre 1881.)

1. ERIGONE NIGRITA sp. nov.
♂ Long. 2^{mm}1 ; pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax très finement chagriné, presque lisse, noir ou brun-rougeâtre très foncé, dans ce cas obscurci dans le milieu et marqué d'une ligne noire marginale ; peu élevé, à ligne dorsale presque droite.— Yeux antérieurs en ligne presque droite par leurs sommets, les médians à peine plus petits, presque équidistants, leurs intervalles plus étroits que le diamètre des médians, les latéraux ovales et obliques. Yeux supérieurs en ligne sensiblement arquée en arrière, égaux et assez petits, intervalle des médians au moins double de leur diamètre, celui des latéraux un peu plus étroit. — Bandeau un peu plus large que l'aire oculaire vertical, garni, surtout dans le milieu, de crins longs et fins. — Chélicères brun-olivâtre, beaucoup plus longues que le bandeau. — Plastron noir brillant, très finement, à peine distinctement chagriné, garni de crins très espacés. — Abdomen ovale assez allongé, acuminé en arrière, noir profond garni de crins fauves isolés. — Pattes très longues et grêles surtout aux extrémités, jaune-rouge vif, concolores ou un peu obscurcies et olivâtres aux extrémités. — Patte-mâchoire fauve avec le tarse et le bulbe brun-rouge ; fémur assez long, presque droit et presque parallèle ; patella

grande, au moins d'un tiers plus longue que large, un peu convexe et légèrement atténuée à la base ; tibia un peu plus court que la patella, plus étroit et cylindrique à la base, un peu dilaté et embrassant la base du tarse seulement à l'extrémité ; tarse à peine aussi long que les deux articles précédents, ovale assez allongé, convexe, atténué et obtus ; bulbe sans stylum détaché.

♀ Long. 2^{mm}5.

Comme chez le mâle. Épigyne en saillie basse transverse, marquée sur sa face postérieure de deux petits tubercules arrondis, séparés par une carène triangulaire déprimée et sub-caniculée.

Eure : Courteil (Power). — Oise : Compiègne (juin 79). — Aube : Troyes ! — Basses-Pyrénées : Bétharram (Lucante).

Espèce intermédiaire aux *Linyphia* et aux *Erigone*, caractérisée par la patte-mâchoire du mâle qui rappelle celle d'un Thérédion.

2. ERIGONE ENSIPOTENS sp. nov.

♂ Long. 2^{mm}.

Céphalothorax fauve-rouge orangé vif sans ligne marginale, presque lisse, brillant ; partie céphalique assez fortement et graduellement élevée, non inclinée dans la région oculaire ; front étroit et obtus, le groupe oculaire occupant toute sa largeur. — Yeux antérieurs en ligne assez fortement courbée en arrière, les médians un peu plus petits, plus resserrés, leur intervalle plus étroit que leur rayon, intervalle des latéraux au moins égal au diamètre des médians. Yeux supérieurs en ligne très légèrement courbée en avant, assez gros, presque égaux, presque équidistants, leurs intervalles environ de même largeur que leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze à peine plus long que large. — Bandeau beaucoup plus large que l'aire oculaire, un peu creusé au dessous des yeux puis sensiblement convexe. — Chélicères robustes, verticales, parallèles, à peine aussi longues que le bandeau. — Plastron brun-rouge brillant, lisse. — Pattes assez longues, jaune clair testacé ; tibia I de même forme que chez *E. rubens* ; fémur I garni en dessous, dans toute sa longueur, de crins spiniformes noirs assez courts et très robustes. — Patte-mâchoire jaune-rougeâtre, très épaisse ; fémur comme chez *E. rubens*, seulement les spicules noirs s'étendant moins en arrière ;

patella assez convexe, presque aussi large que longue et presque parallèle, à peine atténuée en avant; tibia plus long que la patella, plus étroit, sensiblement concave en dessus, sa base pourvue d'une grande apophyse verticale noire, très aiguë et presque droite, au moins aussi longue que l'article; extrémité du tibia pourvue au côté externe d'une apophyse perpendiculaire, courte et très obtuse s'opposant à une saillie du bulbe, et en dessus d'une très longue apophyse déprimée et carénée appliquée sur le tarse et atteignant son extrémité; tarse petit, presque aussi large que long, obtusément et largement tronqué.

Pyrénées-Orientales : Collioure ! — Catalogne : Calella (Cuni y Martorel).

Voisin de *E. rubens* et *rubella* Black., mais facile à distinguer par la longue apophyse aiguë perpendiculaire du tibia de la patte-mâchoire chez le mâle.

3. ERIGONE DISCEDENS sp. nov

♂ Long. 1^{mm}7.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, presque lisse, brillant; front élevé, large (moins que chez *humilis*) et très avancé, avec une grande surface plane oblique, arrondie en avant et garnie de crins rudes? assez courts. — Yeux médians formant un grand trapèze beaucoup plus long que large, les antérieurs petits, très rapprochés, placés au bord antérieur du front, les supérieurs un peu plus gros, beaucoup plus écartés, leur intervalle ayant environ trois fois leur diamètre et plus écartés l'un de l'autre que des latéraux. Yeux latéraux (vus en dessus) visiblement plus avancés que les médians supérieurs, mais plus reculés que les antérieurs. — Bandeau long, très obliquement incliné en arrière et légèrement concave. — Chélicères aussi longues que le bandeau. — Plastron aussi large que long, convexe, brun foncé, lisse, brillant, marqué latéralement de quelques points enfoncés très espacés. — Pattes fauve-olivâtre, normales, assez longues, garnies de crins courts mêlés de quelques crins plus longs en dessous aux fémurs; tibias I et II sans crins spiniformes en dessous. — Patte-mâchoire fauve-olivâtre avec les derniers articles bruns; fémur non élargi à l'extrémité; patella à peine d'un tiers plus longue que large et atténuée à la base; tibia très grand, large dès la base, son côté interne prolongé sur le tarse en une

énorme apophyse, divisée à l'extrémité en deux branches inégales, la supérieure relevée presque verticalement, plus longue, plus grêle, terminée par une légère dilatation obtuse, l'inférieure plus courte et dentiforme ; tarse assez petit, acuminé, ne dépassant le tibia que du tiers de sa longueur ; bulbe pourvu, vers le milieu, d'un fort stylum détaché en demi-cercle, et à l'extrémité d'une apophyse dentiforme perpendiculaire.

Cantal : le Lioran !

Espèce du groupe des *E. humilis* Bl. et *crassiceps* Westr., bien distincte par le front très avancé et atténué.

4. ERIGONE PAUPERA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}3.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, lisse en avant, finement chagriné et légèrement plissé en travers dans le milieu et en arrière ; partie céphalique beaucoup moins élevée que chez *E. humilis*, légèrement convexe, sensiblement atténuée et arrondie en avant, front assez proéminent et arrondi. Yeux médians formant un grand trapèze beaucoup plus long que large, les antérieurs petits, plus resserrés, placés sur la face antérieure et cachés en dessus, les supérieurs un peu plus gros, leur intervalle seulement un peu plus large que leur diamètre, beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux. Yeux latéraux (vus en dessus) presque sur la même ligne que les médians supérieurs. — Bandeau assez élevé, très obliquement incliné en arrière. — Chélicères plus longues que le bandeau et atténuées. — Plastron brun-rouge presque noir, chagriné, ponctué. — Pattes fauve-rouge vif, assez courtes, normales, garnies de crins fins courts. — Patte-mâchoire fauve-rougeâtre ; fémur assez robuste, un peu courbe et comprimé, nullement élargi à l'extrémité ; patella environ deux fois plus longue que large, légèrement convexe et atténuée à la base ; tibia presque aussi long que la patella, élargi dès la base et enveloppant la base du tarse, le milieu de son bord antérieur prolongé en dessus en grande pointe triangulaire appliquée ; tarse médiocre, ovale allongé assez étroit.

Bouches-du-Rhône : Martigues ! — Pyrénées-Orientales : Collioure ! — Corse !

5. ERIGONE TURRIGERA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}6.

Céphalothorax brun-rouge foncé, très finement chagriné brillant ; front très élevé en une pointe cylindrique, verticale, relativement assez grêle, portant à son sommet le lobe céphalique, petit, convexe et un peu incliné en arrière ; vu en dessus ce lobe un peu plus long que large, un peu conique en avant, légèrement atténué en arrière et garni de crins rudes assez longs, séparé à la base par une strie annulaire. Yeux antérieurs en ligne presque droite, resserrés, presque équidistants, leurs intervalles à peine aussi larges que leur rayon. Yeux médians supérieurs situés près le bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle à peine égal à leur diamètre. Bandeau très élevé, vertical, nullement convexe. — Chélicères faibles, plus courtes que le bandeau. — Plastron aussi large que long, convexe, noir brillant lisse. — Pattes normales, fauve olivâtre avec les articulations rembrunies, garnies de crins plus courts que la diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve-olivâtre avec les derniers articles brun-rouge ; patella petite à peine d'un tiers plus longue que large ; tibia plus long, élargi de la base à l'extrémité, ses angles simplement obtus, son milieu prolongé en apophyse assez longue, obliquement relevée, un peu recourbée en bas à la pointe ; tarse assez grand, régulièrement ovale obtus.

Perpignan : bord de la Tet, en octobre.

Se rapproche un peu des *E. straminea* Menge, *nemoralis* Bl. et *Blackwalli* Cb., mais s'en distingue tout de suite par le lobe céphalique petit, élevé sur une sorte de long cou, par l'intervalle des yeux médians supérieurs à peine plus large que leur diamètre, par les yeux du premier rang tous très rapprochés, enfin par le tibia de la patte-mâchoire plus long que large et pourvu en dessus d'une seule apophyse simple et conique.

6. ERIGONE DECOLLATA sp. nov.!

♂ Long. 1^{mm}7.

Céphalothorax brun-rouge avec une ligne marginale noire et le lobe céphalique éclairci, assez fortement et régulièrement chagriné ; front large, obtus et élevé, surmonté d'un gros lobe cépha-

lique très convexe, adhérant seulement au front dans sa seconde moitié, séparé du plan frontal dans sa première moitié, par une profonde échancrure ciliée, marqué de chaque côté d'une impression allongée, limitée latéralement par une carène; vu en dessus lobe céphalique seulement un peu plus long que large, arrondi en arrière, sensiblement atténué et obtusément tronqué en avant; les carènes latérales visibles seulement en arrière et courbes. — Yeux antérieurs en ligne droite, les médians plus petits, leur intervalle plus large que leur rayon, intervalle des latéraux au moins de moitié plus large que leur diamètre. — Yeux médians supérieurs situés au bord antérieur du lobe, presque en avant, leur intervalle à peine égal à leur diamètre. — Chélicères faibles, un peu plus courtes que le bandeau, un peu obliques en arrière. — Plastron aussi large que long, légèrement convexe, brun-rouge foncé, presque lisse brillant. — Pattes normales, fauve clair testacé un peu rougeâtre, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve avec le tarse rougeâtre; patella plus de deux fois plus longue que large, atténuée à la base; tibia avancé sur le tarse en grande lame un peu atténuée, presque droite au bord interne, marquée au bord externe d'une profonde échancrure un peu sineuse, son angle externe prolongé en pointe aiguë, recourbée presque perpendiculairement en dessus; tarse petit, lamelleux, ne recouvrant qu'incomplètement le bulbe.

Gironde : Arcachon, la Teste, Cazeau !

En avril sur les buissons sous bois.

Très voisin d'*E. corrugis* Cb., de Corse, s'en distingue par le lobe céphalique plus gros, plus globuleux non atténué en avant.

7. ERIGONE ERICICOLA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}7.

Céphalothorax brun-rouge avec une ligne marginale noire et le lobe céphalique éclairci, assez fortement et régulièrement chargé; front large, obtus et élevé, surmonté d'un très gros lobe céphalique très convexe, adhérant seulement au front dans ses deux tiers postérieurs et séparé du plan frontal en avant par une échancrure arrondie ciliée, marqué de chaque côté d'une impression allongée limitée latéralement par une carène; vu en dessus, lobe céphalique presque aussi large que long, non atténué,

très obtusément tronqué en avant, arrondi en arrière, les carènes visibles en dessus seulement par leurs extrémités et très divergentes. — Yeux antérieurs en ligne droite, les médians plus petits, leur intervalle plus large que leur rayon, intervalle des latéraux au moins de moitié plus large que leur diamètre. — Yeux médians supérieurs situés au bord antérieur du lobe, presque en avant, mais éloignés de ses angles latéraux, leur intervalle au moins d'un tiers plus large que leur diamètre. — Le reste comme chez *E. decollata*.

Var : Porquerolles !

Commun au printemps sur les bruyères en fleurs.

Très voisin des *E. corrugis* et *decollata* E. S., en diffère surtout par le lobe céphalique encore plus gros et les yeux médians supérieurs plus séparés.

8. ERIGONE MEDUSA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}3.

Céphalothorax brun-rouge foncé, assez fortement et régulièrement chagriné avec le lobe céphalique un peu éclairci et lisse, sensiblement élevé en avant. Front un peu avancé, large et obtus, surmonté d'un lobe céphalique peu reculé, élevé, droit en avant, un peu convexe, et incliné en arrière, marqué latéralement, en arrière des yeux latéraux, d'une très grande et profonde impression ovale un peu anguleuse ; vu en dessus au moins aussi long que large, parallèle et presque carré, divisé en deux lobes parallèles par une très profonde dépression longitudinale échançant son bord antérieur. — Bandeau vertical à peine convexe dans le haut. — Yeux antérieurs en ligne assez fortement courbée en arrière, presque égaux, les médians plus resserrés presque connivents, intervalle des latéraux plus étroit que leur diamètre. Yeux médians supérieurs placés au sommet des lobes céphaliques mais en arrière de l'angle, leur intervalle ayant plus de trois fois leur diamètre. — Chélicères fortes, verticales, plus longues que le bandeau. — Plaston brun-rouge très foncé, fortement et régulièrement chagriné mat, aussi large que long, convexe. — Pattes normales, courtes, fauve avec les fémurs et le milieu des tibias fortement teintés de rouge, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve-obscur avec les derniers articles bruns ; patella très grande

plus de deux fois plus longue que large et atténuée à la base ; tibia long, plus étroit que la patella à la base, sensiblement élargi dans la seconde moitié, pourvu de deux apophyses inégales dirigées en avant sur le tarse et séparées par une échancrure un peu anguleuse, l'interne droite, grêle, aiguë, l'externe beaucoup plus longue, un peu courbe, brusquement recourbée en dessus à l'extrémité, cette partie recourbée un peu lamelleuse et lancéolée ; tarse ovale atténué obtus, assez grand. — Abdomen presque entièrement recouvert d'un grand scutum brun-rouge lisse, finement et densément ponctué.

Var : Hyères ! Dardennes près Toulon ! île de Porquerolles.

Par son lobe céphalique profondément divisé, cette espèce se rapproche de l'*E. radiculata* L. Koch (= *thoracata* Cb.), mais elle en diffère en ce que chacun des lobes est allongé et acuminé en avant.

9. ERIGONE NIGROCÆRULEA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}6.

Céphalothorax brun très foncé presque noir, presque lisse brillant, élevé en avant et surmonté d'un lobe céphalique assez haut et convexe (moins que chez *E. Thorelli*), arrondi et non incliné en avant, séparé du bord frontal par une légère dépression et une strie (beaucoup moins fortes que chez *E. Thorelli*), vu en dessus très large, atténué et arrondi en avant, nullement échancré. Front et bandeau très avancés et inclinés, dépassant de beaucoup en dessus le bord antérieur du lobe et s'avancant en avant des chélicères. — Yeux antérieurs en ligne presque droite, les médians resserrés, leur intervalle à peine égal à leur rayon, celui des latéraux au moins de moitié plus large. Yeux médians supérieurs situés près le bord antérieur du lobe, leur intervalle au moins double de leur diamètre. — Chélicères faibles, courtes et obliques. — Plastron aussi large que long, convexe, noir très brillant. — Pattes assez longues, fauve testacé obscur avec l'extrémité des fémurs et des tibias sensiblement rembrunie, garnies de crins fins assez courts ; fémurs I et II présentant de plus en dessous une rangée de grands crins spiniformes ; tibias I et II garnis en dessous de crins longs plus faibles. — Patte-mâchoire fauve olivâtre avec les derniers articles brun foncé ; patella petite, à peine d'un tiers plus longue que large ; tibia élargi dès la base, son angle

externe simplement obtus, l'interne prolongé en avant sur le tarse en très grande apophyse divisée, presque dès la base, en deux longues branches, la supérieure presque droite, un peu relevée, non atténuée, terminée par une légère dilatation, l'interne un peu plus courte, courbe et aiguë ; tarse grand, beaucoup plus long que la patella et le tibia, ovale, large et obtus. — Abdomen recouvert d'un scutum parsemé de rugosités, très noir à reflets bleus très brillants.

Corse !

Rappelle un peu les *E. trifrons* Camb. et *Thorelli* Westr., en diffère surtout par le lobe céphalique plus bas et non incliné en arrière, vu en dessus atténué et arrondi en avant, par l'apophyse tibiale principale non atténuée et tronquée en biseau à l'extrémité.

10. ERIGONE RUFITHORAX sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}7.

Céphalothorax rouge vif avec une fine ligne marginale et une ligne médiane brun foncé et le lobe céphalique très rembruni ; partie thoracique finement chagrinée et marquée de très fines stries rayonnantes légèrement ponctuées, à peine distinctes. Front obtus peu saillant, surmonté d'un lobe céphalique assez grand, peu reculé, convexe, marqué latéralement d'une impression allongée, commençant au dessus des yeux latéraux et effilée en arrière ; vu en dessus ce lobe presque aussi large que long, arrondi en arrière, à peine atténué, obtus et non détaché en avant. — Bandeau vertical non avancé. — Yeux antérieurs égaux, en ligne fortement courbée en arrière, les médians non soulevés, leur intervalle presque aussi large que leur diamètre, celui des latéraux au moins de moitié plus large que ce diamètre. Yeux médians supérieurs situés près le bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle ayant au moins trois fois leur diamètre. — Chélicères fauves, faibles, un peu plus courtes que le bandeau. — Plastron plus large que long, convexe, brun-rouge clair, lisse et très brillant, avec une fine ligne noire marginale. — Pattes normales, assez courtes, fauve-rouge vif, avec les patellas, métatarses et tarses d'un jaune plus clair, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire jaune clair avec le tibia et le tarse brun foncé ; patella assez courte, de moitié plus longue que large, à peine atténuée à la base ; tibia court, plus

large, élargi de la base à l'extrémité, simplement tronqué, nullement prolongé en apophyse, son angle externe seulement un peu détaché par une légère échancrure en très petite pointe obtuse recourbée en avant; tarse assez grand, ovale, simplement obtus.

Var : Hyères (A. Grouvelle). — Corse : Porto-Vecchio ! Bonifacio !

Se rapproche d'*E. ludicra* Cambr., mais en diffère par le céphalothorax rouge orangé vif, le lobe céphalique moins haut, non soulevé, de niveau avec la partie thoracique et en dessus au moins aussi long que large.

11. ERIGONE CUCURBITINA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}7.

Céphalothorax rouge vif sans ligne marginale, avec le lobe céphalique et le front fauve olivâtre, finement et uniformément chagriné sans points enfoncés. Front élevé, surmonté d'un lobe céphalique plus haut que la moitié de la longueur du céphalothorax entier, abaissé verticalement en arrière et en avant, marqué de chaque côté d'une impression oblique, effilée en arrière et présentant deux points enfoncés; vu en dessus ce lobe très gros, plus large que long, arrondi sur les côtés et en arrière, largement tronqué et légèrement échancré en avant. Bandeau peu convexe presque caché en dessus par le lobe céphalique. — Yeux antérieurs en ligne fortement courbée en arrière, les médians plus petits, leur intervalle presque égal à leur diamètre, celui des latéraux au moins de moitié plus large. Yeux médians supérieurs petits, placés en dessus, aux angles antérieurs du lobe, leur intervalle ayant plus de quatre fois leur diamètre. — Chélicères faibles, visiblement plus courtes que le bandeau. — Plastron aussi large que long, légèrement convexe, brun-rouge clair avec une ligne marginale foncée, très lisse, brillant. — Pattes assez courtes, normales, fauve-rouge vif avec les métatarses et tarses fauve plus clair, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve avec les derniers articles rembrunis; patella au moins deux fois plus longue que large et presque parallèle; tibia presque aussi long, plus étroit, très faiblement élargi de la base à l'extrémité et tronqué carrément, non prolongé sur le tarse, son milieu pourvu d'une petite pointe noire grêle

et obtuse, dirigée en avant dans l'échancrure tarsale; tarse petit, étroit régulièrement ovale et obtus.

Var : Hyères (A. Grouvelle). — Bouches-du-Rhône : Marignane (M. Sédillot).

Assez voisin des *E. ludicra* Cb. et *rufithorax* E. Simon, s'en éloigne cependant par le lobe céphalique obtusément tronqué en avant et par le tibia de la patte-mâchoire étroit et très long.

12. ERIGONE PARUMPUNCTATA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}6.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, chagriné et marqué, sur la partie thoracique, de points enfoncés peu nombreux et espacés, disposés en lignes rayonnantes peu régulières n'atteignant pas le milieu. Front peu saillant, surmonté d'un lobe céphalique court et très élevé, assez avancé, vertical en avant et en arrière, marqué latéralement d'une très grande et profonde fossette ovale occupant presque sa longueur; vu en dessus ce lobe visiblement plus large que long, arrondi en avant et en arrière, nullement atténué en avant, garni de longs crins blanchâtres divergents. — Bandeau vertical, nullement convexe. — Yeux antérieurs en ligne fortement courbée en arrière, les médians beaucoup plus petits, leur intervalle environ égal à leur diamètre, celui des latéraux au moins deux fois plus large. Yeux médians supérieurs situés près le bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle trois fois plus large que leur diamètre. — Chélicères fauve brillant, à peine aussi longues que le bandeau. — Plastron brun-rouge presque noir, presque aussi large que long, convexe, lisse brillant et marqué de gros points enfoncés très espacés. — Pattes normales, peu longues, fauve rougeâtre clair, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire jaune clair avec le tarse un peu rembruni; patella au moins trois fois plus longue que large, atténuée à la base; tibia plus de deux fois plus court, plus étroit à la base, ensuite élargi, prolongé en avant par une apophyse aussi longue que l'article, simple, fortement atténuée, aiguë et un peu relevée; tarse un peu plus long que la patella, assez étroit, presque parallèle, obtus. — Abdomen entièrement recouvert d'un grand scutum noir brillant, fortement, densément et régulièrement ponctué.

Hyères (A. Grouvelle).

Appartient au groupe de l'*E. parallela*, caractérisé par le céphalothorax marqué de gros points enfoncés disposés en lignes rayonnantes, il se rapproche surtout d' *E. inedita* Cambr., il s'en distingue principalement par le lobe céphalique peu reculé, vu en dessus plus large que long, non atténué et non détaché en avant, par le scutum abdominal très large couvrant toute la région dorsale de l'abdomen, enfin par les yeux médians antérieurs beaucoup plus petits que les latéraux.

13. ERIGONE NUNCIA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}8.

Céphalothorax brun très foncé, presque noir, lisse brillant, assez élevé en avant en un lobe céphalique assez bas, assez convexe, très incliné en avant et en arrière, marqué de chaque côté d'une impression longitudinale et parallèle, commençant au dessus des yeux latéraux; vu en dessus aussi large que long, obtusément tronqué en avant, arrondi en arrière, parallèle ou très faiblement élargi en arrière, sa face antérieure garnie de crins rudes divergents assez longs. — Yeux antérieurs en ligne fortement courbée en arrière, les médians très resserrés, intervalle des latéraux un peu plus large que leur diamètre. Yeux médians supérieurs situés au bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle ayant au moins trois fois leur diamètre. — Bandeau légèrement convexe. — Chélicères plus longues que le bandeau. — Plastron un peu plus long que large, convexe, noir, lisse très brillant. — Pattes longues, grêles, jaune clair testacé, tous leurs crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire jaune clair avec les derniers articles rembrunis; patella au moins de moitié plus longue que large atténuée à la base; tibia plus large, graduellement élargi jusqu'au milieu, ensuite graduellement et assez fortement rétréci en pointe triangulaire large et obtusément tronquée, un peu échancrée au bord externe; tarse ovale, relativement petit, plus court que le tibia; bulbe pourvu à l'extrémité de deux petites pointes noires géminées dirigées en avant.

Seine-et-Oise : bois des Gardes, près Boissy-Saint-Léger (oct. 1878). — Seine-et-Marne : Fontainebleau ! Arbonne (juin 1877!). — Hérault : Lieuran, près Béziers (sept. 1875!). — Bouches-du-Rhône : Martigues (oct. 1879). — Var : Saint-Mandrier, près Toulon (oct. 1879!).

Cette espèce semble faire le passage des *E. rurestris* C. K. et *subtilis* Cb. aux *E. flavipes* Bl. et *erythropus* Wstr., elle rappelle les premiers par ses pattes fines et très longues et les seconds par la présence du lobe céphalique.

14. ERIGONE CYCLOPS sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}.

Céphalothorax fauve-rouge clair avec une très fine ligne noire marginale, très lisse brillant, presque droit en dessus, abaissé dans le tiers postérieur, à front assez élevé, étroit et obtus, surmonté d'un lobe céphalique assez haut, long, peu convexe, sensiblement incliné en arrière, tronqué verticalement en avant presque au niveau du bord frontal, marqué latéralement, en arrière des yeux latéraux, d'une impression allongée; vu en dessus étroit et allongé, atténué et tronqué en avant, dépassant le bord frontal. — Yeux antérieurs en ligne droite, resserrés, presque connivents. Yeux médians supérieurs petits et connivents, placés à l'angle antérieur du lobe céphalique. — Chélicères verticales, à peine aussi longues que le bandeau. — Plastron un peu plus long que large, convexe, brun-rouge très lisse brillant. — Pattes normales, assez courtes, fauve-rouge clair, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve avec les derniers articles rembrunis; patella environ de moitié plus longue que large, atténuée à la base; tibia presque aussi long, plus étroit à la base, élargi à l'extrémité, son bord antérieur prolongé en grande apophyse, relevée presque verticalement, assez large dans la première moitié, brusquement rétrécie dans la seconde, un peu recourbée à la pointe; tarse assez grand, ovale large et obtus; bulbe pourvu à l'extrémité d'un fort stylum détaché formant boucle.

Seine-Inférieure : Dieppe (A. Grouvelle). — Corse : Corbara (R. P. Belon).

Espèce très remarquable par la forme très élevée, étroite et atténuée du lobe frontal et par les yeux médians supérieurs connivents.

15. ERIGONE RAYI sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}5.

Céphalothorax brun-rouge avec une ligne marginale noirâtre,

très lisse brillant, graduellement abaissé en arrière, à front très élevé et assez étroit, surmonté d'un lobe céphalique haut, assez petit, peu convexe et très abaissé en arrière, assez fortement atténué en avant, surmonté, dans l'intervalle des yeux médians supérieurs, d'une saillie conique portant deux crins spiniformes longs et robustes arqués et dirigés en avant. — Yeux antérieurs en ligne droite, resserrés, presque connivents. Yeux médians supérieurs petits, placés au bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle au moins double de leur diamètre. — Chélicères verticales, à peine plus longues que le bandeau. — Plastron brun-rouge foncé, lisse brillant. — Pattes normales, assez courtes et robustes, fauve-rouge obscur avec les hanches, les patellas et les tarses éclaircis et testacés, garnies de crins beaucoup plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve rougeâtre avec les derniers articles rembrunis; patella environ d'un tiers plus longue que large et un peu atténuée à la base; tibia un peu plus court que la patella, à peine plus étroit à la base, peu élargi à l'extrémité, pourvu en avant à l'angle interne d'une apophyse un peu plus courte que l'article, assez robuste et arquée en dedans, appliquée sur le tarse et à l'angle externe d'une apophyse dentiforme beaucoup plus petite; tarse grand, ovale large, obtus, convexe; bulbe pourvu d'un stylum détaché formant boucle.

Aube : Villemaure (J. Ray), Gyé-sur-Seine !

Espèce remarquable rappelant un peu par son profil la précédente, mais avec les yeux supérieurs séparés et le sommet du lobe frontal surmonté de deux cornicules recourbés.

Je dédie cette espèce à M. Jules Ray, conservateur du musée de Troyes.

16. ERIGONE SERVULA sp. nov.

♂ Long. 0^{mm}8.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, entièrement lisse brillant, large et court, sensiblement convexe en dessus et légèrement incliné en avant, très fortement incliné en arrière; front large et très obtus non relevé en saillie, marqué de chaque côté d'une petite impression longitudinale étroite faisant suite aux yeux latéraux. Bandeau avancé en pointe conique inclinée, moins longue que l'aire oculaire, atténuée et très obtuse. — Yeux comme chez *E. sila*, seulement les supérieurs un peu plus resserrés, les laté-

raux à peine débordés en dessus. — Chélicères plus longues que le bandeau, un peu dirigées en arrière. — Plastron aussi large que long, convexe, noir très brillant, légèrement ponctué. — Pattes normales, courtes, fauve obscur avec les fémurs rembrunis, garnies de crins courts, mêlés de quelques crins plus longs et raides en dessous aux fémurs et en dessus aux tibias. — Patte-mâchoire fauve testacé avec les derniers articles brun-rouge; patella petite, étroite, environ d'un tiers plus longue que large; tibia plus long, large, avancé sur le tarse en large pointe très convexe, à peine atténuée, pourvue à l'extrémité au bord externe d'un groupe de forts crins noirs spiniformes recourbés en dehors, vue de profil cette pointe tibiale très convexe, brusquement abaissée à l'extrémité et prolongée sur le tarse par une petite lame contournée; tarse petit, plus court que le tibia, ovale large; bulbe sans stylum externe. — Abdomen noir, garni de poils fauves longs et presque entièrement recouvert d'un scutum très noir ponctué.

Aisne : Laferté-Milon (détritus de marais, mars 1880 !), vallée de Savières, près le Port-aux-Perches. — Oise : forêt de Compiègne (mousses humides, oct. 1879). — Seine-et-Oise : Saint-Léger ! — Seine-et-Marne : Montigny-sur-Loing (mars 1879).

Voisin d'*E. sila* Cambr., dont il se distingue principalement par la partie céphalique marquée de deux petites impressions faisant suite aux yeux latéraux, et par le bulbe dépourvu de stylum externe.

17. ERIGONE TAURICORNIS sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}2.

Céphalothorax fauve olivâtre sans ligne marginale, très finement (à peine distinctement) chagriné brillant, court, large et peu élevé, presque plan en dessus; front tronqué carrément et large (moins que chez *bicuspis*) avec les angles fortement prolongés en pointes triangulaires obtuses, portant chacune un denticule noir grêle et plus long que chez *bicuspis*, inséré latéralement un peu en arrière du sommet et dirigé très obliquement en dehors. — Bandeau vertical, un peu convexe au dessous des yeux en forme de bourrelet. — Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus long que large, les antérieurs petits et très resserrés, les supérieurs plus gros, ovales et obliques, leur intervalle un peu

plus large que leur diamètre. Yeux latéraux largement séparés des médians, placés un peu au-dessous des médians antérieurs, au dessous des saillies frontales. — Chélicères verticales, un peu plus longues que le bandeau. — Plastron à peine plus long que large, convexe, fauve olivâtre, très lisse brillant. — Pattes normales, courtes, fauve olivâtre clair, garnies de crins courts mêlés de quelques crins plus longs en dessus aux tibias. — Patte-mâchoire fauve testacé; patella assez longue, au moins de moitié plus longue que large; tibia étroit à la base ensuite élargi, le milieu de son bord antérieur prolongé en pointe conique, obtuse et relevée un peu moins longue que le corps de l'article, son côté interne très avancé et tronqué obliquement avec l'angle supérieur prolongé par une tige grêle et droite dirigée obliquement en dessus; tarse grand, ovale, très obtus; bulbe pourvu vers le milieu d'un fin stylum formant boucle et près l'extrémité d'expansions membraneuses.

Valais : Vassorey, près Bourg-Saint-Pierre ! (juillet 1877).

Bien distinct d'*E. bicuspis* Camb., par le front beaucoup plus étroit et plus anguleux, les cornicules plus forts et aussi par une disposition différente de l'apophyse tibiale.

18. ERIGONE VERTICALIS sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}8.

Céphalothorax brun-rouge foncé avec une ligne noire marginale, presque lisse brillant, assez fortement et graduellement élevé en avant, à front assez étroit, simplement obtus, surmonté en arrière d'un petit lobe vertical grêle et obtus, hérissé de longs crins divergents et portant latéralement, près la base, les yeux médians de la seconde ligne. Yeux antérieurs en ligne droite, les médians plus petits, équidistants, leurs intervalles environ égaux au diamètre des médians. — Bandeau élevé, vertical, très légèrement creusé. — Chélicères verticales, aussi longues que le bandeau. — Plastron un peu plus long que large, légèrement convexe, brun très foncé avec une marge noire, très lisse brillant. — Pattes normales, assez longues, fauve rougeâtre, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve avec les derniers articles rembrunis; patella petite, environ de moitié plus longue que large, atténuée à la base; tibia presque aussi long, élargi de la base à l'extrémité, son angle externe un peu

saillant en pointe courte, aiguë, recourbée en dedans, son milieu prolongé en pointe plus longue, dirigée en avant, droite, un peu relevée, sub-aiguë ; tarse grand, large, presque parallèle, très obtusément tronqué. — Abdomen noir, sans scutum, garni de crins assez longs.

Corse !

Rappelle un peu les *E. altifrons* et *justa* Cambr., mais bien reconnaissable à la petite pointe ciliée qui surmonte le cône céphalique.

19. ERIGONE DIGITICEPS sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}6.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, presque lisse en dessus, finement chagriné sur les côtés ; presque droit en dessus, abaissé dans le tiers terminal ; front droit, nullement élevé ; en arrière de l'angle frontal et des yeux latéraux une grande pointe assez grêle, d'abord dirigée obliquement en haut, puis coudée horizontalement en avant et dépassant le bord frontal, cylindrique dans sa première moitié, très légèrement élargie et un peu déprimée dans la seconde, terminée en pointe simple et obtuse, garnie, surtout latéralement, de crins forts et longs, portant en dessus, vers le milieu, les yeux médians de la seconde ligne. Yeux antérieurs en ligne droite, resserrés, les médians un peu plus écartés, leur intervalle à peine plus large que leur rayon, élevés sur une légère saillie commune. — Chélicères assez robustes, plus longues que le bandeau. — Plastron presque aussi large que long, noir brillant, très finement chagriné. — Pattes courtes, normales, fauve-rouge obscur, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Patte-mâchoire fauve-obscur rembrunie à l'extrémité ; patella presque trois fois plus longue que large, fortement atténuée à la base ; tibia plus court, plus large, tronqué obliquement avec l'angle externe prolongé en petite pointe très courte, obtuse et perpendiculaire, l'angle interne prolongé en une grande apophyse, aussi longue que la patella, assez grêle, obtuse et simple dirigée en avant sur le tarse et légèrement arquée en dedans ; tarse petit, plus court que la patella, presque parallèle, très obtus. — Abdomen noir, garni de poils fauves.

Bouches-du-Rhône : Marignane !

L'une des formes les plus singulières du genre *Erigone* ; le

céphalothorax rappelle un peu celui d'un *E. foraminifera* Cb. dont le lobe antérieur manquerait et dont le postérieur, très allongé, serait recourbé en avant.

20. ERIGONE GRADATA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}3.

Céphalothorax lisse brillant, brun rougeâtre, avec une ligne marginale et une fine ligne médiane noirâtres, élevé et convexe dans le milieu, fortement incliné en arrière dans le tiers postérieur, brusquement abaissé en avant près du groupe oculaire, celui-ci relevé, séparé ainsi du plan dorsal par une profonde échancrure prolongée latéralement par de larges dépressions dirigées obliquement en arrière; en dessus 3 ou 4 crins très longs disposés en une ligne médiane longitudinale. — Yeux antérieurs en ligne légèrement arquée en arrière, les médians un peu plus petits et plus resserrés, leur intervalle aux latéraux à peine égal à leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne très légèrement arquée en arrière, égaux, intervalle des médians presque double de leur diamètre, celui des latéraux un peu plus étroit. Yeux médians formant un trapèze aussi large que long. — Bandeau un peu plus large que l'aire oculaire, légèrement convexe. — Chélicères plus courtes que le bandeau, faibles, un peu divergentes, obliquement renfoncées. — Plastron brun-olivâtre, plus foncé à la marge, presque lisse. — Pattes relativement longues et assez grêles, fauve-olivâtre obscur avec la base des fémurs, les patellas, l'extrémité des tibias et des métatarses et les tarse très éclaircis et testacés, garnies de crins courts presque égaux, sauf quelques-uns plus longs en dessous aux fémurs. — Patte-mâchoire fauve testacé avec le tibia et le tarse brun-rouge; fémur grêle, assez long et parallèle, un peu courbe; patella au moins deux fois plus longue que large et atténuée à la base; tibia aussi long que la patella et beaucoup plus long que large, atténué à la base, prolongé en dessus en avant par une apophyse un peu plus courte que le corps de l'article, assez robuste, obtuse, un peu arquée en dehors, pourvue, vers le milieu de son bord externe, de deux petits denticules noirs; tarse très grand, déprimé et obtus; bulbe volumineux, présentant vers le milieu un très long stylum grêle détaché formant boucle et à l'extrémité une grande lame noire

également repliée en cercle et pourvue, près de l'extrémité, de deux petits denticules.

Cantal : le Lioran, sur les sapins !

Également à Nuremberg en Bavière (L. Koch.).

Cette espèce ne se rapproche d'aucune autre connue et forme à elle seule un groupe spécial.

21. ERIGONE POLITA sp. nov.

♂ Long. 2^{mm}2.

Céphalothorax fauve-rouge obscur, plus foncé en avant, presque lisse, brillant, presque droit en dessus, incliné fortement dans le dernier tiers, peu élevé, à front obtus et peu convexe, surmonté d'un lobe céphalique grand et oblique, peu convexe, presque droit en dessus, abaissé verticalement en avant, marqué latéralement, en arrière des yeux latéraux, d'une impression profonde, ovale, prolongée en arrière par une strie ; vu en dessus plus long que large, parallèle, tronqué droit en avant, non atténué en arrière. — Yeux antérieurs en ligne peu courbée, les médians plus petits, presque connivents, les latéraux un peu plus séparés, leur intervalle néanmoins plus étroit que leur rayon. Yeux médians supérieurs situés près le bord antérieur du lobe céphalique, gros, leur intervalle à peine égal à leur diamètre. — Chélicères plus longues que le bandeau, atténuées et légèrement divergentes à l'extrémité, fortement et régulièrement striées en travers. — Plastron un peu plus long que large, fauve-rouge obscur, finement chagriné mat. — Pattes, jaune orangé vif, relativement longues, normales, garnies de crins courts, excepté en dessous aux fémurs. — Patte-mâchoire jaune avec les derniers articles brun-rouge ; patella environ deux fois plus longue que large, grêle, sensiblement atténuée à la base à bords droits ; tibia beaucoup plus court, très élargi, tronqué obliquement avec l'angle externe peu saillant et non prolongé, l'angle interne prolongé en une grande apophyse falciforme coudée en dessus et effilée, non denticulée ; tarse presque aussi long que la patella et le tibia réunis, large à la base, très acuminé obtus ; bulbe pourvu d'un fort stylum enroulé. — Abdomen gris fauve plus obscur en dessus.

Aube : forêt d'Aumont ! dans des mousses épaisses.

Voisin d'*E. mitrata* Menge, s'en distingue par le lobe céphalique plus long que large, tronqué en avant et parallèle, non res-

serré à la base, par l'intervalle des yeux médians supérieurs à peine égal à leur diamètre, par l'apophyse tibiale non denticulée, enfin par les chélicères striées transversalement,

22. ERIGONE GLAPHYRA sp. nov.

♂ Long. 2^{mm}.

Céphalothorax fauve-rouge vif un peu plus foncé en avant, presque lisse brillant, sensiblement convexe en dessus, fortement incliné dans le dernier tiers, légèrement creusé en arrière du lobe céphalique; front obtus et peu convexe, surmonté d'un lobe céphalique grand, un peu oblique, non convexe, incliné en avant et en arrière, marqué latéralement, au delà des yeux latéraux, d'une impression assez profonde, presque parallèle, effilée en arrière, vu en dessus ce lobe plus long que large, parallèle, obtusément tronqué en avant, arrondi en arrière, divisé par une fine strie longitudinale.—Yeux antérieurs en ligne presque droite, les médians plus petits, leur intervalle plus étroit que leur rayon, celui des latéraux au moins de moitié plus large que leur diamètre. Yeux médians supérieurs placés près le bord antérieur du lobe, gros, leur intervalle plus large que leur diamètre mais non double. Bandeau très convexe arrondi dans le haut. — Chélicères plus longues que le bandeau, verticales, un peu divergentes dans la seconde moitié, non striées. — Plastron un peu plus long que large, légèrement convexe, fauve-rouge obscur avec une fine ligne noire marginale, lisse brillant. — Pattes assez longues, normales, fauve-rouge orangé vif avec les tibias antérieurs fortement rembrunis, presque noirs, leurs crins assez robustes, plus courts que le diamètre des articles, excepté quelques-uns en dessous aux fémurs et aux tibias antérieurs. — Patte-mâchoire jaune avec les derniers articles brun-rouge; patella environ deux fois plus longue que large, presque parallèle à bords droits; tibia plus court, très élargi et tronqué presque droit, son angle externe simplement obtus, l'interne prolongé en une apophyse sub-aiguë, un peu courbe, le milieu de son bord antérieur prolongé en apophyse plus longue, relevée presque verticalement, droite, aiguë, non denticulée; tarse plus court que la patella et le tibia, presque aussi large que long et presque arrondi; bulbe sans stylum enroulé. — Abdomen noir brillant, garni de poils fauves assez longs.

♀ Long. 2^{mm}3.

Céphalothorax fauve-rouge obscur avec la partie céphalique rembrunie et une fine ligne noire marginale, lisse brillant un peu chagriné seulement à la marge, rebord mince avec une très légère strie sub-marginale visible seulement en arrière; partie céphalique assez convexe à front étroit; partie thoracique à strie médiane fine. — Yeux supérieurs très gros, en ligne assez fortement arquée en arrière, presque équidistants, leurs intervalles environ d'un tiers plus étroits que leur diamètre. Yeux antérieurs en ligne droite, presque connivents, les médians un peu plus petits, intervalle des latéraux beaucoup plus étroit que le rayon des médians. Yeux médians en trapèze beaucoup plus long que large. — Bandeau au moins aussi large que l'aire oculaire, un peu creusé au dessous des yeux. — Plastron brun-rouge, cordiforme, presque aussi large que long, presque lisse. — Pattes fauve-rouge vif avec les métatarses et tarses testacés, les tibias I et II fortement rembrunis, crins courts, crins dressés bien sensibles au moins à la paire IV. — Patte-mâchoire fauve olivâtre obscur, tibia plus long que la patella, assez fortement élargi. — Epigyne en grand plaque brunâtre, marquée en arrière d'une fossette testacée semi-circulaire, beaucoup plus large que longue, à bords ciliés.

Aisne : Guise (M. Sédillot, mai 1875). — Oise : la Brévière dans la forêt de Compiègne! — Aube!

Voisin des *E. mitrata* Menge et *polita* E. S., s'en distingue chez le mâle par le bandeau convexe avancé en large pointe conique, et par les yeux latéraux antérieurs largement séparés des médians.

23. ERIGONE CURTA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}3.

Céphalothorax presque lisse, brun-foncé avec une ligne marginale, une tache médiane thoracique et sur la partie céphalique trois fines lignes convergeant en arrière, noirâtres; très large et court, légèrement convexe en avant et peu atténué, à front large et obtus, le groupe oculaire occupant toute sa largeur. — Yeux antérieurs en ligne courbée en arrière, les médians au moins deux fois plus petits que les latéraux, beaucoup plus resserrés,

leur intervalle aux latéraux au moins double de leur diamètre. Yeux supérieurs assez petits, égaux, en ligne très fortement courbée en arrière, en demi-cercle, les médians plus resserrés, leur intervalle presque double de leur diamètre, celui des latéraux ayant au moins trois fois ce diamètre. Yeux médians formant un grand trapèze beaucoup plus long que large. — Bandeau vertical, légèrement convexe, visiblement plus étroit que l'aire oculaire (à partir des yeux latéraux). — Chélicères un peu plus longues que le bandeau, verticales, assez robustes et parallèles. — Plastron noir, lisse très brillant. — Abdomen noir mat finement ponctué en dessus, garni de crins fauves fins et espacés. — Pattes très courtes et robustes, fauve olivâtre, avec les fémurs et les tibiais légèrement obscurcis aux extrémités, garnies de crins courts. — Patte-mâchoire courte et robuste; fémur comprimé un peu courbe; patella petite, étroite, un peu convexe; tibia un peu plus court, presque deux fois plus large, et beaucoup plus large que long; tronqué droit à l'extrémité avec l'angle externe légèrement saillant et obtus, l'interne prolongé par une petite pointe aiguë dirigée en avant; tarse très grand, volumineux, convexe dans le milieu, abaissé en avant, marqué en dessus dans la première moitié, d'une grande dépression rebordée renfermant une saillie noire transverse; bulbe complexe pourvue vers le milieu d'un très long et fin stylum libre formant boucle et près l'extrémité d'une petite tige grêle et droite, dirigée en avant.

Bouches-du-Rhône : Martigues (M. Sédillot). — Catalogne : Arbucias (Cuni y Martorel).

Voisin d'*E. brevipes* Westr., dont il diffère par la seconde ligne des yeux très fortement arquée en arrière avec les médians beaucoup plus resserrés que les latéraux.

24. ERIGONE GENISTÆ sp. nov.

♂ (jeune) long. 1^{mm}.

Céphalothorax brun-rouge foncé avec le lobe céphalique noir, finement chagriné brillant, assez convexe; front élevé en un lobe céphalique aussi long que la moitié de la longueur totale du céphalothorax, tout à fait vertical, assez étroit et parallèle, arrondi au sommet, vu en dessus beaucoup plus large que long, tronqué droit en avant, arrondi en arrière avec les angles un peu saillants en petits lobes ovales et obliques portant les yeux latéraux.

— Yeux antérieurs en ligne courbée en arrière, placés presque au sommet du lobe et sur sa face antérieure, les médians petits, leur intervalle plus étroit que leur diamètre, celui des latéraux au moins double. Yeux médians supérieurs situés en dessus, vers le milieu du lobe céphalique, leur intervalle au moins double de leur diamètre et marqué d'une faible dépression un peu triangulaire. Yeux latéraux légèrement disjoints. — Bandeau très haut, légèrement creusé au dessous des yeux, un peu avancé au dessus des chélicères. — Chélicères verticales, aussi longues que le bandeau. — Plastron aussi large que long, convexe, noir brillant lisse. — Pattes relativement très courtes et robustes, fauve rougeâtre, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles. — Abdomen aussi large que long, presque arrondi, un peu déprimé en dessus, couvert d'un scutum très noir ponctué. — (Patte-mâchoire non développée).

Corse : Campo di l'Oro près Ajaccio.

Espèce très reconnaissable à la forme de l'éminence frontale.

25. ERIGONE INCLARA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}5.

Céphalothorax brun-rouge, très finement chagriné; front large (moins que chez *E. brevis*) et obtusément tronqué; ligne dorsale presque droite. — Yeux antérieurs en ligne assez fortement arquée en arrière, les médians un peu plus petits, beaucoup plus resserrés, intervalle des latéraux au moins double de leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne presque droite, égaux, assez petits, intervalle des médians au moins double de leur diamètre, celui des latéraux plus étroit. Yeux médians formant un trapèze plus long que large. — Plastron noir lisse très brillant, convexe. — Pattes relativement assez longues, assez robustes, fauve rougeâtre très obscur avec les patellas, métatarses et tarses un peu éclaircis. — Patte-mâchoire robuste et assez longue, fauve obscur avec le tibia et le tarse très rembrunis; patella au moins d'un tiers plus longue que large atténuée à la base; tibia aussi long que la patella, un peu plus large, mais très atténué à la base comme pédiculé, son angle externe un peu saillant et conique, le milieu de son bord antérieur prolongé sur la base du tarse en une apophyse courte, épaisse, tronquée et même très légèrement

échancrée ; tarse très grand, beaucoup plus long et plus large que les deux articles précédents, parallèle et obtusément tronqué à l'extrémité, nullement atténué.

Corse !

Facile à distinguer de toutes les espèces du même groupe par la forme du tarse de la patte-mâchoire qui est parallèle, nullement atténué et tronqué à l'extrémité.

26. ERIGONE STATIVA sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}5.

Céphalothorax entièrement et finement chagriné, brun-rouge presque noir avec une ligne noire marginale ; front assez étroit, obtusément tronqué ; ligne dorsale presque droite. — Yeux antérieurs en ligne droite, les médians plus petits, beaucoup plus resserrés, intervalle des latéraux environ double du diamètre des médians. Yeux supérieurs en ligne droite, assez petits, égaux, les médians à peine plus resserrés, leur intervalle environ de moitié plus large que leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus long que large. — Plastron noir brillant lisse, faiblement chagriné sur les bords. — Pattes courtes et robustes fauve-rouge obscur. — Patte-mâchoire courte et robuste ; patella petite, à peine plus longue que large, parallèle, nullement convexe ; tibia un peu plus court et plus large, son angle supéro-externe prolongé en avant par une apophyse presque aussi longue que l'article, nullement divergente, assez épaisse, déprimée, simplement obtuse ; tarse très grand, ovale, beaucoup plus long et plus large que les deux articles précédents.

Corse !

Voisin d'*E. scabrosa* Cambr., il s'en distingue par les yeux supérieurs en ligne droite, et l'apophyse tibiale du mâle simple et obtuse, nullement bifide et dirigée en avant.

27. ERIGONE WESTRINGI sp. nov.

♂ Long. 1^{mm}5.

Céphalothorax lisse, brun olivâtre plus foncé en avant, avec une ligne marginale et dans le milieu deux traits obliques presque noirs ; front moins large que chez *E. Sundevalli*. — Yeux mé-

dians supérieurs un peu plus resserrés que les latéraux. Yeux antérieurs en ligne légèrement arquée en arrière, les médians plus petits, leur intervalle plus étroit que leur diamètre, celui des latéraux ayant au moins deux fois le diamètre des médians. — Bandeau plus large que l'aire oculaire, un peu creusé au dessous des yeux, puis vertical. — Plastron noir lisse. — Pattes jaune testacé, comme chez *E. Sundevalli*, seulement épines plus fines. — Patte-mâchoire : fémur presque droit et parallèle ; patella petite à peine plus longue que large ; tibia plus long que la patella, fortement élargi à l'extrémité, en dessus le milieu de son bord antérieur un peu avancé, conique et très-obtus, sans échancrure ni crin dressé ; tarse gros, ovale large, à peine atténué, non acuminé à la base sans crins claviformes.

Seine-et-Oise : Chennevières-sur-Marne ! Mennecey ! — Oise : forêt de Compiègne !

Voisin d'*E. Sundevalli* Westr., dont il diffère surtout par le tarse de la patte-mâchoire du mâle, plus gros, ovale, non acuminé en dessus et dépourvu de crins spiniformes, et par le bandeau visiblement plus large que l'aire oculaire.



Simon, Eugène. 1881. "Description d'espèces nouvelles du genre Erigone."
Bulletin de la Société zoologique de France 6, 233–257.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41621>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/74940>

Holding Institution

American Museum of Natural History Library

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.