

Corselet convexe, formant un cercle un peu aplati dont le plus grand diamètre a près de deux fois la largeur de la tête; lisse avec des points légers parsemés sur sa surface; très faiblement rebordé. Écusson en triangle très ouvert et arrondi au sommet. Élytres *soudés*, chagrinés, parallèles, coupés carrément à leur base, non déprimés au-dessous des épaules, arrondis à leur extrémité, légèrement rebordés, un peu plus de deux fois aussi longs que le corselet et une fois et demie aussi larges que la base de celui-ci. Abdomen dépassant sensiblement les élytres. Corps plus clair en dessous et revêtu ainsi que l'abdomen de poils jaunes, ces poils étant plus serrés sur les côtés. Hanches comme chez le mâle, cuisses plus renflées et plus courtes, tibias postérieurs sensiblement plus forts et plus gros; les tarses antérieurs plus grêles que les médians et les postérieurs plus courts que ceux des deux premières paires de pattes.

Brésil : Vallée du Rio Parana-Panema (État de Saô Paulo).

La ♀ de cette espèce est beaucoup plus rare que le ♂; elle doit avoir, comme l'*Hypocephalus*, une existence souterraine. On rencontre l'un et l'autre sexes dans les sentiers, après la pluie. Le ♂ est assez vif et vole bien, mais la ♀, qui est aptère, est lourde, tombant sur le dos au moindre obstacle, et dans l'impossibilité de se relever si elle n'a pas dans son voisinage quelque brindille à laquelle elle puisse s'accrocher. À l'état parfait, elle ne paraît pas devoir manger; je n'ai jamais vu trace d'excreta dans la boîte où j'en ai conservé une quelques jours.

Ichneumonides capturés en 1898 et descriptions de deux espèces nouvelles [HYMÉN.]

Par Maurice Pic.

I. — Ichneumonides capturés aux environs de Digoin (Saône-et-Loire).

Heresiarches eudoxius Wesm., Les Guerreaux (1). Cette espèce est très rare, M. l'abbé Berthoumieu m'informe qu'elle n'a pas dû être reprise en France depuis Sichel. — *Ichneumon consimilis* Wesm.,

(1) Voici quelques renseignements sur les localités citées dans cette note : Saint-Agnan et Les Guerreaux sont deux communes situées, la 1^{re} à 9 kil., la 2^e à 14 kil. environ de Digoin; Marcilly, chef-lieu de canton, à 25 kil.

Vignes (Hautes-Alpes); Seyne et Couloubroux (Basses-Alpes), au-dessus de Digne; Saint-Étienne, Saint-Sauveur, forêt de Turini [au-dessus de Nice], Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes).

Marcigny. — *I. castaneus* Grav., bois d'Isanghy sur Saint-Agnan. — *I. magus* Wesm., bois d'Isanghy. — *Amblyteles oratorius* F., Les Guerreaux et Digoin. — *A. Panzeri* Wesm., Les Guerreaux (Thérèse Pic). — *Platylabus nigrocyaneus* Gr., Les Guerreaux (Th. Pic). Cette espèce est rare. — *P. leucogrammus* Wesm., Les Guerreaux (Th. Pic et M. Pic). Espèce rare. — *Dicelotus ruficoxatus* Gr., Les Guerreaux sur un arbre vert.

Phaeogenes martialis (Berth. in litt.) n. sp. — ♀ Noir avec les pattes et les segments abdominaux 1 à 4 (y compris le pétiole) roux. Tête subcubique, grosse, sans points blancs au vertex, fortement et assez densément ponctuée, avec les joues dilatées, le front un peu convexe. Antennes médiocres, filiformes, d'un roussâtre obscurci avec le 1^{er} article foncé, annelées de blanc. Écusson noir. Aréole supéro-médiane semicirculaire. Stigma brun. Postpétiole presque lisse, bicaréné, avec l'aire médiane très large; segments 1-4 roux, 5-7 en majeure partie foncés. Hanches noires, sans crêtes. Pattes assez grêles, roussâtres, un peu rembrunies à l'extrémité des cuisses et des tibias postérieurs — Long. 8 mill.

Les Guerreaux, sur un arbre vert (M. Pic). — Par les hanches postérieures simples et la forme de sa tête cette espèce doit se placer près de *P. cephalotes* Wesm. et se ranger auprès de lui dans la monographie de M. l'abbé Berthoumieu.

II. — Ichneumonides recueillis dans les Alpes françaises.

Ichneumon Steckii Kriech. var., Seyne [espèce décrite de Suisse]. — *I. cordiger* Kriech. var., Veynes [espèce décrite de Hongrie]. — *I. monostagon* var. *luctuosus* Grav., St-Martin-Vésubie. — *I. faunus* Grav., St-Martin-Vésubie. — *I. defraudator* Koch., Turini.

Ichneumon Berthoumieui n. sp. — ♀ Noire avec l'abdomen entièrement, ou presque entièrement, et la majeure partie des pattes roussâtres. Tête noire, à face protubérante, avec les mandibules rousses, les orbites de la face, 2 points au vertex et une grande tache sur les joues blancs. Antennes médiocres, à 6^e article carré, subfiliformes, très épaissies à l'extrémité, noires et annelées de blanc. Écusson noir, taché de blanc à l'extrémité, notaules distincts. Aréole supéro-médiane semicirculaire; spiracules ovales. Stigma brun; aréole deltoïde, étroite au sommet. Postpétiole parfois rembruni ou obscurci, aciculé, lisse à l'extrémité; gastrocèles petits, subobsoles. Abdomen en ovale elliptique, à segments 2-7 roux ou parfois 6-7 rembrunis. Tarière assez saillante.

Hanches noires, les postérieures à ponctuation espacée en dessous. Pattes rousses, parfois en partie rembrunies, avec les trochanters, l'extrémité des cuisses et des tibias postérieurs obscurcis ainsi qu'une partie des tarsi. — Long. 6-7 mill.

Seyne (B.-A.) et forêt de Turini (A.-M.), en battant des arbres verts (Pic, in coll. Berthoumieu et Pic).

Voisin de *I. vaccinatorius* Gr., mais pas de trait blanc sous les ailes, coloration des membres plus claire, etc.

Je suis heureux de donner à cette espèce nouvelle le nom de l'obligé collègue infatigable déterminateur de mes récoltes.

Exephanes occupator Grav., St-Martin-Vésubie. — *Neotypus lapidator* Fabr., Seyne et Couloubroux. — *Platylabus rufiventris* Wesm., Couloubroux. — *P. leucogrammus* Wesm., Seyne et Couloubroux. — *Herpestomus xanthops* Grav., Seyne. — *Diadromus collaris*, St-Étienne. — *Phaeogenes fulvitaris* Wesm., Couloubroux. — *Ph. macilentus* Wesm., Seyne. — *Ph. fuscicornis* Wesm., Seyne. — *Ph. amoenus* Wesm., Seyne.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances). — 1898, II, 26. — 1899, I, 1 et 2. — LORTET : Chute des Crustacés ostracodes fossiles observés à Oullins, près de Lyon, le 24 septembre 1898.

Entomologist (The), XXXII, 428, 1899. — A.-G. BUTLER : Notes on the Genus *Euchloë* Hübner, a Genus of the Pierinae. — G.-N. KIRKALDY : A Guide to the Study of British Waterbugs (Aquatic Rhynchota). — PH. DE LA GARDE : Mediterranean Lepidoptera. — T.-D.-A. COCKERELL : Two new Genera of Lecaniine Coccidae. — Notes on the Nomenclature of some Hymenoptera. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), n° 416, 1899. — G.-C. CHAMPION : Some Remarks on the *Phytosus balticus* Kr. and *P. nigriventris* Chev., of British Collections. — G.-W. KIRKALDY : *Corixa Saundersi* a new Species of aquatic Rhynchota from England. — A.-E. EATON : List of Ephemeridae hitherto observed in Algeria with localities, (fig.). — D. SHARP : On some insular Coleoptera collected by J.-J. Walker. — T.-A. CHAPMAN : Butterflies in south and north Norway. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), XXIX, 339, 1899. — E.-R. DU-



Pic, Maurice. 1899. "Ichneumonides captures en 1898 et descriptions de deux especes nouvelles (Hymen.)." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1899, 8–10. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.8617>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34171>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.8617>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/8617>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.